

Aus der Univ. Hautklinik Erlangen. Vorstand: Prof. Dr. Leo Hautk.

1935

Über absichtlich erzeugte Hautbeschädigungen (Artefakte).

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Friedrich Michel
approbierter Arzt
aus Nürnberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 29. Mai 1935.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1935

1935/347

Dekan: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med. Fr. Jamin.
Referent: Professor Dr. med. L. Hauck.

Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Der Arzt wird manchmal bei Hautveränderungen vor die Frage gestellt, ob sie von selbst entstanden sind, oder ob die Kranken sie künstlich hervorgebracht haben. Die Tatsache, daß es Menschen gibt, die sich am eigenen Leibe selbst beschädigen, ist längst bekannt und man hat solche „künstlich“ und mit „Absicht“ erzeugte Hautveränderungen mit dem Namen „Artefakte“ belegt. Wenn sie auch nicht besonders selten vorkommen, und die Mitteilungen solcher Beobachtungen im Laufe der Zeit sich gemehrt haben, so bieten doch derartige Fälle für die Diagnosestellung oft noch recht erhebliche Schwierigkeiten. Das beruht einerseits auf der Mannigfaltigkeit der zur Erzeugung der Hautentstellungen benützten Mittel und Methoden und demzufolge einem sehr variablen klinischen Bild, andererseits auf den seltsamen Beweggründen, die solchen Betätigungen zugrunde liegen und die oft aus raffinierter Überlegung heraus so verschleiert werden können, daß ihre Aufdeckung großen Scharfsinn erfordert.

Die Mittel, welche zur Selbstbeschädigung verwendet werden, können so kompliziert, gesucht und fernliegend sein, daß sie von vornherein nicht in den Bereich der Möglichkeit gezogen werden, oder sie sind wiederum so banal, so alltäglich, daß sie angesichts des seltsam anmutenden Krankheitsbildes außer Acht gelassen werden. Sie hängen zum Teil von der Intelligenz, aber auch in vielen Fällen von der beruflichen Betätigung der betreffenden Personen ab. So wird z. B. häufig beobachtet, daß Dienstmädchen im Haushalt viel gebrauchte Putzmittel, wie Säuren oder Alkalien zur Selbstbeschädigung benützen.

Im allgemeinen lassen sich nach der Art der verwendeten Mittel drei Gruppen der Selbstbeschädigung unter-

scheiden: durch chemische, thermische und mechanische Einwirkung hervorgerufene Hautschädigungen. Von diesen drei Gruppen ist die erstgenannte die am häufigsten vorkommende und zu ihr gehören neben zahlreichen chemischen Agentien auch mancherlei pflanzliche Reizstoffe. Thermische Methoden dagegen sind im Schrifttum nur selten angeführt, was wohl aus ihrer größeren Schmerzhaftigkeit zu erklären sein dürfte. Zur Erzeugung artifizeller Hautveränderungen bedarf es allerdings nicht immer solch heroischer Mittel, wie Säuren und Laugen, oder anderer chemischer Stoffe, auch schon mittels einfachster, mechanischer Gewalteinwirkung lassen sich leicht gewünschte Hautdefekte erzielen. Hierbei ist dann nicht einmal irgend ein Instrument, oder körperfremder Gegenstand vonnöten, sondern sogar mit dem kratzenden Fingernagel, oder nur durch starkes Reiben mit den Fingern können Hautläsionen verursacht werden (*Polland, Rasch*).

Im Laufe der Jahre sind so überaus zahlreiche, verschiedenste Methoden und Mittel aufgedeckt worden, deren sich die Kranken in einschlägigen Fällen bedienen, daß sie eine nahezu endlose Reihe bilden. Es gibt wohl nichts, meint *Frieboes*, was nicht gelegentlich zur Selbstbeschädigung verwendet wird. Daher ist es natürlich auch unmöglich, an dieser Stelle alle Mittel einzeln anzuführen, oder näher auf sie einzugehen. Es möge deshalb genügen, wenn im folgenden einige der charakteristischsten Fälle des Schrifttums wiedergegeben werden, die einen treffenden Einblick in das Wesen der Artefakte und in die gebräuchlichsten Verfahren ihrer Erzeugung ermöglichen, die aber auch teilweise wegen ihrer Seltenheit, ja oft kaum glaublichen Originalität eingehendere Beachtung verdienen.

Was die inneren Beweggründe betrifft, die zu Artefakten Veranlassung geben, so unterscheidet hier *Brauer* ätiologisch zwei Gruppen von Kranken: 1. Psychisch Erkrankte, denen die Selbstbeschädigung dazu dient, die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung auf sich zu lenken, ihr Mitleid zu erregen, sie zu zwingen, sich mit ihnen zu beschäftigen, und sich den Reiz zu verschaffen, sie und den Arzt zum besten zu halten

und zu betrügen. Diese abnorme Sinnesrichtung, diesen ganz uferlosen Symptomenkomplex kennzeichnet der Begriff der Hysterie! 2. Geistig, wenn auch nicht moralisch gesunde Personen. Diesen bietet die Selbstbeschädigung ein Mittel zur Erlangung unberechtigter Vorteile, zum Schutz vor unangenehmen Verbindlichkeiten, sowie zur Befreiung aus unerwünschten Lebenslagen. Diese zweite Gruppe umfaßt das Simulantentum, das im Weltkrieg eine so traurige Rolle spielte und dessen Erkennung gerade heute für die modernen Unfallmedizin von größter Bedeutung ist.

Beide Gruppen verfahren bei der Erzeugung ihrer Hautveränderungen stets in einer Art und Weise, wie ihre Bildung, ihre Intelligenz, die ihrem Verhalten zugrunde liegende Absicht und die zur Verfügung stehenden Mittel es sie am zweckdienlichsten erscheinen lassen. Nach außen unterscheiden sich die beiden Gruppen häufig schon durch die Lokalisation der Hautbeschädigungen. Die Hysterischen bevorzugen, entsprechend ihrer Absicht Aufsehen und Interesse zu erregen, Stellen, die besonders sichtbar sind, also Gesicht und Hände; aber auch die Brüste und die Genitalregion sind oft befallen, was sich aus der meist krankhaften Sexualität dieser Personen erklärt. Bei den Simulanten finden sich die Selbstbeschädigungen immer an Körperstellen lokalisiert, welche die Betrüger für ihr jeweiliges unlauteres Vorhaben am geeignetsten erachten. Es sind z. B. bei dem einen hauptsächlich die Füße und Unterschenkel Sitz der Artefakte, da der Betreffende marschuntauglich erscheinen möchte, um vom Militärdienst befreit zu werden. Ein anderer, dem daran gelegen ist, sich eine Unfall- oder Invalidenrente zu erschleichen, sucht beispielsweise durch eine Selbstverstümmelung an Händen und Armen Arbeitsunfähigkeit vorzutäuschen. So läßt sich hier aus der Lokalisation der Krankheitsercheinungen meist schon eine bestimmte betrügerische Absicht erkennen, der sie dienen soll.

Im folgenden sei zuerst auf die Simulation etwas näher eingegangen und zunächst ihr Begriff noch einmal klar festgelegt.

Nach *Kauffmann* versteht man unter Simulation die

Vortäuschung von Krankheiten, oder krankhaften Erscheinungen, welche in Wirklichkeit gar nicht existieren, oder nicht im Zusammenhang mit einem Unfälle, oder Betriebsunfälle stehen, zur Erreichung von Vorteilen, oder Abwendung von Schäden. Sie wird unter folgenden Umständen beobachtet:

1. Nach Begehung strafbarer Handlungen, nach Übertretungen und strafbaren Unterlassungen.
2. Bei drohenden Haftstrafen, Gerichtsterminen.
3. Bei lästig empfundenen Leistungsverpflichtungen.
4. Zur Erlangung von Ansprüchen, Renten, Ersatzansprüchen aus Erkrankungen und Verletzungen.

In der UV. (Unfallversicherung) ist das ausschließliche Motiv der Simulation die Erwirkung einer hohen Entschädigung. Der Simulant ist immer ein Betrüger und wegen Betruges strafbar. Die Gerichtspraxis beweist die große Verbreitung des Nährbodens, auf welchem der Betrug in seinen verschiedensten Formen gedeiht und läßt es als selbstverständlich erscheinen, daß auch die UV., und zwar sowohl die private, wie auch die öffentliche, trotz ihrer sozialen Aufgabe Raum für den Betrug bietet. In den ersten Jahren des Bestehens der UV. hat man sich zu leicht mit der Simulation abgefunden. *Boediker* erklärte 1891 am Berner Unfallkongreß: „Die Simulation spielt eine ganz untergeordnete Rolle.“ Man suchte diese Ansicht auch mit Zahlenangaben über das verhältnismäßig seltene Vorkommen zu belegen. Diese können aber nichts beweisen, weil die Häufigkeit der Simulation nach den Äußerungen verschiedener Autoren innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt.

Die Schwierigkeit des Nachweises der Simulation wetteifert mit der Leichtfertigkeit, mit welcher sie geübt wird. Deshalb ihre Häufigkeit, welche *Liek* zu der Erklärung veranlaßte: „Die UV. demoralisiert.“

Das Land der durchtriebensten Simulanten ist Italien. Nach den Angaben des Augenarztes *E. Trombetta* bestehen in Italien eigentliche Simulantenschulen, wo die Arbeiter in alle Geheimnisse der Simulation eingeweiht werden und auch lernen einer Aufdeckung ihres Betruges zu entgehen.

Daß diese Schulen nicht erfolglos arbeiten, beweisen vor allem zahlreiche Beobachtungen an einer ganz besonderen Art der Selbstbeschädigung, nämlich der Selbstquetschung des Handrückens. Die ersten Veröffentlichungen hierüber stammen aus der Schweiz. *E. Patry* beobachtete die Affektion 1901 und 1902 in 42 Fällen, nachdem er 1899 den ersten und 1900 fünf weitere Fälle davon gesehen hatte. Er stellte über diese eigenartige Selbstbeschädigung folgendes fest: Die Kranken waren ausnahmslos Italiener, elf aus derselben Stadt oder ihrer Umgebung, welche alle bei zwei Logiesgebern wohnten. 28 Fälle kamen vom September bis Dezember zur Beobachtung, also mit Beginn ungünstiger Witterung, welche bei den Südländern die Sehnsucht nach der warmen Heimat wachrief. Die meisten Verletzten verlangten daher, sofort nach Italien reisen zu dürfen. 34 Fälle betrafen die linke Hand. In 10 von 48 Fällen wurde mit Sicherheit die betrügerische Absicht festgestellt.

Patry beschreibt die Erzeugung der Selbstquetschung nach den Angaben eines italienischen Arbeiters: „Um eine Schwellung der Hand zu erzeugen, muß man sie mit einem beliebigen Gegenstande eine gute Viertelstunde klopfen und dies anfangs jeden Tag wiederholen, weil die Schwellung sich während der Nacht verliert. Nach einiger Zeit bleibt die Schwellung länger bestehen und es genügt dann, in der Woche einmal zu klopfen. Zuerst klopft man sanft. Sobald die geklopfte Stelle warm wird, läßt der Schmerz nach und man kann stärker klopfen.“ Wichtig ist noch eine andere Angabe des gleichen Arbeiters, daß man mit demselben Erfolge, wie den Handrücken, das Knie und den Fußrücken beklopfen könne und daß das Klopfen sich auch in Krankenhäusern ausführen und fortsetzen lasse.

Über die Folgen der Selbstquetschung äußerte sich nach *Patry* ein weiterer Arbeiter dahin, daß man nicht zu lange klopfen dürfe, sonst verliere sich die Schwellung nicht mehr, oder dauere zu lange. Diese Angabe findet durch eine Beobachtung *Kauffmanns* Bestätigung. Er konnte bei einem 35 jährigen Arbeiter, der ihm erst 16 Monate nach dem Unfall zur diagnostischen Klärung überwiesen wurde, fest-

stellen, daß das nach schwächerem Klopfen sich einstellende oberflächliche und periphere Oedem sich innerhalb weniger Tage wieder verliert, während Klopfen von langer Dauer zu einer sehr hartnäckigen, tiefen, schwieligen, mit einer Verdickung der Strecksehnen vorwiegend des Zeige- und Mittelfingers einhergehenden Infiltration führt und dadurch meist eine verminderte Beugefähigkeit dieser Finger zur Folge hat.

Die Diagnose der Selbstquetschung des Handrückens ist nach *Kauffmann* nur möglich, wenn man den Verlauf einer durch wirklichen Unfall entstandenen solchen Quetschung kennt. Sie entsteht wie jede andere Quetschung nur durch direkte Gewalteinwirkung. Wegen der Lockerheit des subkutanen Gewebes und der Leichtigkeit der Verbreitung des Blutergusses in demselben, ist sie durch eine rasch sich bildende, bedeutende primäre Schwellung ausgezeichnet. Infolge Kompression der zahlreichen Venen des Handrückens durch den Bluterguß und infolge der abhängigen Lage der Hand beim Herumgehen, tritt gewöhnlich in den ersten Tagen noch starkes Hautoedem in der Nachbarschaft des Quetschungsherd, auch an den Fingern, besonders an deren Streckseite, hinzu. Bei ruhiger Bettlage, Hochlagerung der Hand und Applikation von feuchtwarmen Umschlägen verlieren sich Schwellung und Bluterguß ebenso rasch, wie an anderen Körperstellen; und wenn vom dritten bis fünften Tage ab, d. h. zur Zeit, wo die Schmerzen schwinden, regelmäßige Bewegungen der Finger und Hand, bei fortgesetzter Hochlagerung und feuchtwarmer Wickelbehandlung ausgeführt werden, so erzielt man in ein bis zwei Wochen Heilung. *Kauffmann* warnt vor Massage oder Einreiben von Salben in solchen Fällen. Die Massage wirke auf das blutig infiltrierte, lockere Gewebe ähnlich, wie die primäre Quetschung und rege neue Blutungen an, sodaß Oedem und Bluterguß nicht weichen wollen. Von einer ambulanten Behandlung der Selbstquetschung des Handrückens rät *Kauffmann* wegen der geringen Aussichten auf Heilung ab. Es kann auch hierbei leicht vom Verletzten die Hand aufs neue mißhandelt

werden, um die Heilung in die Länge zu ziehen. So berichtet er von einem Verletzten, dessen Zustand sich lange nicht besserte, obwohl er das Bett hüten mußte und vom Arzt regelmäßig besucht wurde. Nach einigen Wochen verriet der Zimmergenosse, daß der Verletzte stets nach dem Besuche des Arztes die kranke Hand unter der Bettdecke reibe und darauf liege.

Die Selbstquetschung des Handrückens kann sich im frischen Zustande und während der ersten Tage ganz wie eine durch einen Unfall entstandene Quetschung verhalten. Wie *Kauffmann* darlegt, muß eine Selbstquetschung vermutet werden, wenn ein Arbeiter eine Ursache angibt, wodurch der Handrücken nicht gequetscht werden kann, z. B. durch einen Fall auf die ausgestreckte Hand und den Handteller. Sobald durch die Röntgenuntersuchung eine Knochenverletzung ausgeschlossen erscheint, soll man solche Fälle als Unfallsfolge abweisen.

Bei genauer Untersuchung findet man schon bald Besonderheiten der Selbstquetschung. Sie ist auf den Handrücken beschränkt, während die unbeabsichtigte Quetschung meist Veränderungen an der Streck- und Beugeseite der Hand erzeugt. Dazu kommt, daß bei dieser, je nach der Art der Gewalteinwirkung, verschieden ausgedehnte und intensive Erscheinungen und Veränderungen nachweisbar sind, während jene wohl gleichartige Veränderungen schafft, welche aber entweder gar nicht, oder doch nur in geringem Grade an der Beugeseite hervortreten.

Von der Selbstquetschung des Handrückens muß noch ein künstlich erzeugtes Handrückenödem unterschieden werden. *Baer* konnte von einem damit behafteten Arbeiter in Erfahrung bringen, daß es von ihm durch subkutane Injektion einer Säure am Handrücken bei gleichzeitiger Umschnürung des Vorderarmes erzeugt worden war. Die Feststellung der Stichstelle am Handrücken mit leichter Nekrose der Sticheränder, sowie die deutlich sichtbare Umschnürungsstelle am Vorderarm, ließen diese raffinierte Entstehungsart des Handrückenödems erkennen.

Kauffmann sah ein mehrere Monate altes Handrücken-

oedem, das durch Injektion von Speiseessig unter die Haut und nachheriges, fortgesetztes Beklopfen erzeugt worden war. Nach vierwöchentlicher, scharf kontrollierter Bettruhe verschwand es unter Kataplasmenbehandlung und Hochlagerung fast ganz.

Stöß teilt folgenden Fall von angeblicher Fingerquetschung mit: Ein Schlossergeselle brachte eine Quetschung des linken Zeigefingers als Unfallfolge zur Anzeige. Die Heilung dauerte sehr lange. Nach längerer Behandlung in einer Krankenanstalt attestierte der behandelnde Arzt völlige Erwerbsunfähigkeit. Im Verlaufe eines Prozesses wegen übertriebener Ansprüche wurde bekannt, daß der Mann bei gewöhnlicher Arbeit plötzlich laut aufgeschrien habe, um einen Unfall zu fingieren und am folgenden Morgen den Finger in Carbol getaucht hatte, sodaß er anschwell. Auch späterhin wiederholte er dies jedesmal vor dem Besuche des Arztes.

Eine wichtige Rolle spielt bei den Simulanten die Selbsterzeugung von Wunden und die Verhinderung ihrer Heilung. Zur leichteren Erkennung solcher Wunden führt *Kauffmann* folgende Charakteristika an: Es handelt sich in der Regel um erbsen- bis bohnen große Hautdefekte, die eine rundliche, oder rechteckige Form haben, vielfach mit einem schwarzen Aetßchorf bedeckt sind, oder üppige Granulationen aufweisen. Sie trotzen hartnäckig jeder Behandlung und sind meist auf dem Handrücken, oder an der Streckseite eines Fingergelenkes, besonders der linken Hand gelegen. Wie er in Erfahrung bringen konnte, bevorzugen die italienischen Arbeiter zur Selbstverwundung die Streckseite des rechten Zeigefingers. Hier pflegen sie sich über dem Mittelgelenk eine Schnittwunde beizubringen, deren normalen Heilverlauf sie durch Verätzung oder andere Reizmethoden verhindern, sodaß schließlich unter starker Narbenbildung eine Fingerversteifung sich einstellt.

Wie bei der Selbstquetschung, so kommt es auch bei der Selbstverwundung häufig vor, daß das betrügerische Treiben selbst unter ärztlicher Behandlung und Beobachtung lange Zeit unerkant fortgesetzt werden kann. Nach *Patry*

werden zufällig akquirierte, oder selbsterzeugte Wunden mit einem Tropfen Salzsäure betupft und dann mit geschmolzenem Fett übergossen, worauf sich der Aetzkohlschwarz färbt. Der Schmerz hält etwa eine Viertelstunde an. Anfangs wird diese Verätzung nach jedem Besuche des Arztes wiederholt, später ist sie seltener notwendig. Zur Verhinderung der Heilung einer Wunde wird nach demselben Autor auch eine Fischgräte, oder ein Stück eines Zahnstochers in die Wunde gesteckt und am folgenden Morgen entfernt, oder diese wird mit Rost, Tabak oder Asche bestreut, welche zwei Stunden vor dem Besuche des Arztes mit warmen Wasser wieder abgewaschen werden.

Kauffmann hörte von Arbeitern, daß Wunden mit Eßig und Kochsalz verbunden werden, damit sie langsam heilen. Ebenso läßt sich durch Blasenpflaster oder eine Seidelbastsalbe die Heilung von Wunden verhindern.

Liniger teilt einen Fall von künstlichen Offenhaltens einer Wunde des linken Handrückens mit: 41 Jahre alter Schlosser. Rentenbezug während fünf Jahren. Entlarvung in einer Strafanstalt, wohin ihn der Diebstahl einer Kuh gebracht hatte. Mit der am Rande geschärften Platte eines Fingerringes hatte er sich am linken Handrücken eine kleine Wunde beigebracht. Mittels eines aus einem Rosenkranz gewonnenen Stückchen Drahtes, das unter den Wundrand gehoben worden war, wurde durch Jahre hindurch eine Eiterung unterhalten. Der Mann erhielt eine Zusatzstrafe von 9 Monaten Zuchthaus. Die Kosten des Verfahrens und die Rentenrückerstattung wurde ihm überdies auferlegt.

Wie Selbstverwundungen in mannigfachster Art und Weise beigebracht werden und hierbei oft mit größter Raffiniertheit vorgegangen wird, findet sich ebenfalls bei *Kauffmann* an einigen Fällen dargelegt. So schildert er z. B. eine interessante Form der Selbstverwundung, die vornehmlich in der Schweiz zur Beobachtung gelangte. Dort wurden von Fuhrleuten vielfach Pferdebißse als Unfall angemeldet, die sich jedoch als Artefakte erwiesen und mit einem zangenförmigen Instrument, dessen Form das Gebiß eines Pferdes nachahmte, an den Armen erzeugt wurden.

Weiter erwähnt *Kauffmann* noch eine Reihe von Verwundungen, welche in betrügerischer Absicht vorgenommen und geradezu „gepflegt“ wurden. Einige solche Fälle seien hier noch angereiht. Ein Maurer, der acht Jahre die Rente für 50%ige Erwerbsbeschränkung wegen teilweisen Verlustes des Unterschenkels bezogen hatte, stellte den Antrag auf Rentenerhöhung, weil durch das Tragen des Stelzfußes der Amputationsstumpf wund geworden sei. Abweisung durch das Schiedsgericht, weil keine Wunde bestand. Eine vom Reichsversicherungsamt angeordnete elftägige Beobachtung in einer Anstalt hatte das Ergebnis, daß der Mann nicht nur offensichtlich übertrieb, sondern sich die neuerdings wieder am Stumpfe festgestellten Wunden künstlich beigebracht hatte, wie aus deren Beschaffenheit, besonders der haar-scharfen Abgrenzung sicher hervorging. Wegen des unlauteren Verhaltens mußte der Rentner die Kosten der Untersuchung und Beobachtung im Krankenhause bezahlen.

Ein Arbeiter in Luzern bekannte, sich eine Verwundung des Unterschenkels in folgender Weise beigebracht zu haben: Erst wurde die gesunde Haut mit Glaspapier wundgerieben und am folgenden Tage eine Säure auf die wund Stelle geträufelt. Es entstand das Bild einer oberflächlichen Hautschürfung mit schmutzig grauem Belage. Die Heilung erfolgte sehr langsam. Mehrere gleich aussehende Selbstbeschädigungen kamen ungefähr zu derselben Zeit zur Beobachtung, sämtlich bei italienischen Arbeitern aus der gleichen Ortschaft, oder ihrer Umgebung.

Ein Weber erzeugte durch Bestreuen mit Kantharidenpulver eine Furunkulose des Vorderarmes und eine sich öfters wiederholende Hautentzündung mit Blasenbildung. Er wurde mehrere Male erfolglos behandelt und erschlief sich eine Vollrente. Wegen Betruges wurde er zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Einen weiteren beachtenswerten Beitrag zur Frage der Erzeugung von Artefakten lieferte *Riecke*, der an Hand eines Falles den Nachweis erbringen konnte, daß es gelingt, mittels konzentrierter Kochsalzlösung nach oberflächlicher

Hautritzung eine tiefe Kutisnekrose hervorzurufen, was durch den Autor auch experimentell bestätigt wurde.

Allgemein äußert sich zur Selbstbeschädigung der Haut *Kauffmann* dahin, daß jede umschriebene, tiefgreifende Hautläsion, für deren Entstehung nicht eine zutreffende Angabe vorliege, als Kunstprodukt angesehen werden müsse. Ebenso solle jede einfache, kleinere Wunde, welche bei korrekter Behandlung in der erforderlichen Zeit nicht heile, den Gedanken an eine böswillige Einwirkung zur Verzögerung der Heilung wecken. Im gleichen Sinne betont *Ganzoni*, daß an Artefakt immer zu denken ist:

1. Bei einem merkwürdigen klinischen Befund, der keinem bekannten Krankheitsbild entspricht.
2. In Fällen, bei denen aus der Anamnese der objektive Befund nicht geklärt werden kann.

Eine strafrechtliche Verfolgung sollte nach Ansicht des Autors nur dann eintreten, wenn der Tat das bewußte Erlangen eines rechtswidrigen Vorteils zugrunde liegt. Psychopathen sollten nur ausnahmsweise belangt werden und auch eine zufällige Versicherung sollte hier keinen Grund zur Strafe bilden; hingegen sei die versicherungstechnische Ablehnung solcher Schäden die beste Prophylaxe gegen Rezidive.

Die Anwendung der Selbstbeschädigung reicht zurück bis ins Altertum. Der erste Arzt, der simulierte Krankheiten zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Abhandlung machte, *Galen*, schildert bereits derartige Krankheiten der Haut: *Ὡς δὲ ἐξελέγχειν τοὺς προσποιουμένους νοσεῖν*. (Über die Notwendigkeit der Entlarvung von Simulanten).

Eine wichtige Rolle, weshalb im folgenden auch näher darauf eingegangen sei, spielt dieses verbrecherische Vorgehen im Militär- und Heeresdienst, wo es von so manchem geübt wird, der sich seiner Pflicht für Volk und Vaterland entziehen will. Seit jeher hatten die Heere aller Nationen, von denen des alten Griechenland und Rom angefangen, besonders aber seit Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, derartige Simulanten in ihren Reihen. Daß in Kriegszeiten die Zahl solcher Personen zunimmt, ist nicht verwunderlich; denn im Krieg finden sich Artefakte vor allem als Aus-

druck von Schreck- und Angstpsychosen bei Drückebergern. Ungemein häufig kamen Selbstbeschädigungen im Weltkrieg zur Beobachtung, sodaß sogar besondere Lazarettabteilungen dafür eingerichtet werden mußten. Die Erfahrungen, die hier durch vielfache Beobachtungen gesammelt wurden, bilden eine bedeutame Bereicherung unserer Kenntnisse über Artefakte.

Schock stellt fest, daß die Neigung zu Artefakte sich im Weltkrieg erheblich gesteigert hat. Er fand sie meist bei geistig Minderwertigen und Psychopathen. Jedoch liegt seiner Meinung nach nicht in allen Fällen eine solche krankhafte Veranlagung vor, weshalb eine Verallgemeinerung nicht statthaft sei.

v. Zumbusch beobachtete bei den Soldaten vornehmlich gegen Kriegsende eine Häufung von künstlich erzeugten Hautleiden, deren Zweck darin bestand, sich vor einer Abstellung ins Feld zu sichern, oder von dort wieder in die Heimat befördert zu werden. Der Autor berichtet über dieses „traurige Kapitel,“ daß Sprengstoffe, Schmieröle, Ätzmittel und oft ganz raffinierte Kompositionen aus verschiedenen scharfstoffigen Substanzen, deren Rezepte heimlich unter den Simulanten von Hand zu Hand gingen, zur Selbstbeschädigung verwendet wurden, ja, daß man sogar Verbrennungen mit glühendem Eisen dem Arzt als spontan entstandene Dermatosen vorzeigte. So leicht meist auch die Diagnose war, so schwer sei es, besonders als sich die Disziplin zu lockern begann, gewesen, die Hautbeschädigungen zur Heilung zu bringen; denn die Krankheiten wurden mit großer List und oft mit einem Heroismus, der einer besseren Sache würdig gewesen wäre, erzeugt und in Blüte erhalten.

Waldstein teilt Wahrnehmungen im Kriege über künstlich erzeugte Phlegmomen mit. Er konnte solche an 60 Soldaten beobachten, die durch Einspritzung chemischer Präparate hervorgerufen wurden. Diese Einspritzungen nahm der Betreffende selbst vor, oder sie wurden von seinen Kameraden meist im Urlaub, während der Eisenbahnfahrt oder auf den Klosetts vorgenommen. Zum

Unterschied von den echten Phlegmomen fand der Autor den Allgemeinzustand bei diesen arteficiellen Fällen auffallend gut. Histologisch ließen sich in den subkutanen und tieferen Schichten Hohlräume erkennen. Bakterien waren nicht vorhanden, dagegen im Vordergrund stehende Nekrosen der Haut. Meist waren die unteren Extremitäten befallen. Der Verlauf gliederte sich in drei Stadien: 1. Schwellung und Rötung. 2. Blasenbildung. 3. Nekrose mit nur langsam fortschreitender Heilung und Bildung kallöser Wundränder, die eine Epithelisierung verhinderten.

Schmidt beschreibt eine Reihe von Fällen pseudovenerischer Geschwüre, die sich im Laufe des Weltkrieges gehäuft hätten. Seine Fälle stammen alle aus demselben Truppenteil. Es fanden sich dabei an der Berührungsfläche von Glans und Praeputium Erosionen, die in Größe und Form übereinstimmten, also in Art eines Spiegelbildes auftraten. Die Erosionen zeigten spärliche Sekretion, vergrößerten sich nicht, sondern heilten in einigen Tagen ab. Mikroskopisch fand sich niemals die *Spirochaeta refringens*. Die zur Selbstbeschädigung verwendeten Mittel waren dabei: Aetßoda, Nießwurz, Cuprum sulfuricum, Wolfsmilch, Getreidebrand, Zigaretten. Zuerst wurde die Stelle mit dem Finger aufgerieben und dann das Aetßmittel angewandt und nach acht bis zehn Stunden war die erwünschte Erosion vorhanden. Die verwendeten Mittel hat der Autor durch Geständnis der Kranken in Erfahrung gebracht, oder sie durch Untersuchung nachweisen können.

Riecke beobachtete einen ähnlichen Fall absichtlicher Hautschädigung am männlichen Genitale, die zwecks Vortäuschung eines venerischen Leidens vorgenommen worden war: Es fanden sich im Praeputialsack und an der Glans auf stark entzündlicher Basis, von einem breiten, hyperämischen Saum umgeben, pustulöse Herde und erodierte, regellos gestaltete Stellen, mit einem dünnen Eiterbelag, teilweise auch stark serös sezernierend. Als Krankheitsursache wurde der Milchsaft einer Euphorbiacee, welche im Lazarettgarten wild wuchs, nachgewiesen.

Besonders nahe lag im Weltkrieg die Selbstbeschädigung

durch Schußverletzungen, die aber nach *Jankovič* als „Nahschuß“-Verletzungen die Entlarvung der Täter leicht machten, sodaß bald die Anwendung chemischer Mittel vorgezogen wurde.

Über 70 hier einschlägige Fälle hat aus der österreichisch-ungarischen Armee *Sachs* gesammelt. Darunter fanden sich bei 49 Soldaten künstlich erzeugte Hautkrankheiten und bei 21 Soldaten künstlich erzeugte Geschlechtskrankheiten. Bei den Hautaffektionen handelte es sich vorwiegend um Verätzungen und zwar meist im Bereich der Unterschenkel. Die Diagnose war gewöhnlich leicht, schwer jedoch oft die Feststellung der Ursache. Oft gelingt nach den Autor nur die Diagnose per exclusionem. Auch ihm fiel das innerhalb einzelner Truppenteile gehäufte Auftreten auf.

Zwei weitere typische Simulationsfälle bei Soldaten beschreibt *Gouin*: Bei dem ersten Fall handelte es sich um ein fünfmarkstückgroßes, scharf umschriebenes Unterschenkelgeschwür mit schorfigem Grund, das von normaler, nicht entzündeter Haut umgeben war und einem ulcerösen, zerfallenen Gumma ähnlich sah. Bei der Behandlung bekannte der Kranke, dieses Geschwür durch Kaliumbichromat hervorgerufen haben. Der zweite Soldat wies eine ekzematöse, auffallend stark vesikulöse und nässende Dermatitis am Bein auf; diese Dermatitis wurde mit Rinde von „*Daphne gnidium*“ verursacht und solange unterhalten, daß der Kranke vier Jahre lang dienstuntauglich war. *Daphne gnidium* ist ein sehr gebrauchtes Volksmittel zum „Herausziehen böser Säfte“.

Der Verfasser bezeichnet es als eine Notwendigkeit für den Arzt — besonders für den Militärarzt — Selbstbeschädigungen der Haut als solche feststellen zu können und die zahlreichen Mittel (Öle, Säuren, Salze, Pflanzen, Harze, Baumrinde usw.), die zur Erzeugung von Hautgeschwüren und Ausschlägen gebraucht werden, zu kennen.

Äußerst wertvoll und interessant sind ferner die von *Brauer* im Weltkrieg gesammelten und 1917 veröffentlichten Erfahrungen über Artefakte bei Soldaten. Er legt an Hand von 24 Fällen aus den Jahren 1914–1917 dar, daß man

es hierbei mit einer leider nicht seltenen Kriegsdermatose zu tun habe, die eine weit größere Beachtung verdiene, als sie bis dahin gefunden hätte. *Brauer* machte bei seinen Fällen die gleichen Beobachtungen wie *Sachs*, daß nämlich die Diagnose leicht, meist schon auf den ersten Blick gestellt werden konnte. Dagegen habe die Aufdeckung der zur Anwendung gebrachten Reizstoffe bzw. -Methoden oft größere Schwierigkeiten bereitet, denen er aber dadurch zu begegnen suchte, daß er die Kleider und mitgebrachten Gegenstände jedes zur Aufnahme kommenden Kranken sofort in Gegenwart eines Arztes untersuchen ließ, eine Maßnahme, durch die vielfach die zur Selbstbeschädigung verwendeten Mittel zutage gefördert wurden und die der Autor daher in solchen Fällen stets anzuwenden empfiehlt. Er konnte durch diese Methode bei den Simulanten u. a. folgende Mittel beschlagnahmen: spanisches Fliegenpflaster, konzentrierte Essigsäure, rohe, rauchende Salzsäure, rohe Schwefelsäure, rauchende Salpetersäure, Karbolsäure, Ätzkalk, kaustisches Alkali, Lysol, Blätter vom Hahnenfuß, Samen und Stengel von Brennesseln und Kautabak. Auch das bekannte Putzmittel Sidol wurde wegen seines Amoniakgehaltes von den Simulanten mit Erfolg benutzt. In einem Falle war erhitzter Sigellack zur Erzeugung von Blasen und Geschwüren verwendet worden. Einmal fand sich Jodoform, das sich der Betreffende mit einem, einer Tätowiernadel ähnlichen Instrument in die Haut eingeführt hatte. Einem Mann wurde in je einem Papierbeutel metallisches Quecksilber, sowie eine amalgamierte Silbermünze abgenommen. Er hatte durch Aufbinden der in Quecksilber getauchten Münze auf die Haut ein Abfließen des Metalls von der Haut zu verhindern gewußt und dadurch eine Dermatitis mit Geschwürsbildung erzeugt. Bei einem anderen, der außerdem ein ganzes Arsenal von spanischem Fliegenpflaster bei sich führte, wurde ein graues Pulver gefunden, das sich als einem Pferde ausgekämmter, mit Haaren untermischter Staub erwies, in dem sich zahlreiche, lebende Milben befanden. *Brauer* läßt es dahingestellt, ob der Simulant dieses Pulver, wie er angab, als Mittel

gegen Läuse und Flöhe gebrauchen, oder, wie in manchen Gegenden üblich, als stark wirkendes, hautreizendes „Luckpulver“ verwenden wollte, oder ob er hoffte, bei sich gelegentlich zur Abwechslung die Pferderäude zu erzeugen. In diesem Falle hätte er allerdings seinen Zweck verfehlt, da es sich bei den Milben nicht um Exemplare der allein auf den Menschen übertragbaren *Sarcoptes communis* handelte. Man sieht aus diesen angeführten Beispielen, wie der Erfindungsgabe einzelner oft sehr originelle Betätigung gelingt.

Beachtenswert in dieser Hinsicht erscheint noch eine weitere Mitteilung *Brauers*: Er fand bei den mit Artefakten eingelieferten Soldaten mehrfach Salben vor, die scheinbar einen ganz indifferenten Charakter hatten, bei deren genauerer Untersuchung sich jedoch eingemengte Reizstoffe ermitteln ließen. *Brauer* gelang dies dadurch, daß er kleine Salbenmengen in Tetrachlorkohlenstoff auflöste. Die hierbei oft als kleinste Pünktchen frei werdenden korpuskulären Teilchen brachte er unter das Mikroskop und konnte sie nicht so selten als Bestandteile von spanischen Fliegen (von Flügeln, Flügeldecken, Fühlern usw.) feststellen; eine Beobachtung, die den Autor zu der Forderung veranlaßte, daß bei Simulanten alle nur irgendwie verdächtigen Flüssigkeiten und Salben eingezogen werden mußten und eingehend chemisch, sowie mikroskopisch zu untersuchen seien. In zweifelhaften Fällen könne man auch einen biologischen Versuch machen und an kleinen Hautstellen eine etwaige Reizwirkung des zu untersuchenden Mittels erproben.

Bezüglich der Lokalisation von Selbstbeschädigungen im Kriege weist *Brauer* darauf hin, daß dem Soldaten zumal in einer Zeit, in der die Schlachten „mit den Beinen“ gewonnen werden, naturgemäß Unterschenkel und Füße als gegebenes Feld für seine Betätigung erscheinen müssen. Beingeschwüre sind allgemein bekannt; ihre lange Dauer, sowie ihre schwere Heilbarkeit mögen vielen ein Dogma sein. Auch war bekannt, daß so mancher Soldat wegen dieses Leidensalskriegsverwendungsunfähig zurückgewiesen wurde. Wer Geschwüre an den Beinen hatte, war sicher, von dem

anstrengenden Fußdienst befreit zu werden, er kam in das Revier, oder in das Lazarett und wenn auch dort das Übel nicht weichen wollte, konnte er damit rechnen als untauglich entlassen zu werden.

Nach den Darlegungen *Brauers* waren 90% der von ihm im Weltkrieg beobachteten Fälle mit Artefakten Angehörige eines gewissen Volksstammes und entstammten der ländlichen Bevölkerung Westpreußens. Unter ihnen befanden sich vier Brüderpaare, deren Dermatosen eine ganz besonders enge Verwandtschaft in Lokalisation, Charakter und Verlauf nicht verleugnen konnten. Bezeichnenderweise fühlten sich zwei Brüderpaare anfangs bewogen, jede Verwandtschaft zu bestreiten. Auf Grund dieser Wahrnehmungen neigt *Brauer* zu der Annahme, daß diese artefiziellen Dermatosen endemisch und familiär auftreten können. Ähnliche Beobachtungen haben wie aus obigen Ausführungen hervorgeht, ja auch *Patry*, *Kauffmann* und *Sachs* gemacht.

Die Behandlung von Artefakten gestaltet sich nach den Angaben *Brauers* denkbar einfach, da bei ihr in der Regel die allgemeinen Vorschriften der Wundversorgung gelten. Er schlägt zur Beschleunigung der Abstoßung nekrotischer Teile zunächst feuchte Verbände vor, sodann feststehende Okklusivverbände, durch die es den betreffenden Personen unmöglich gemacht werde an die erkrankten Hautstellen heranzukommen und diese von neuem zu schädigen. Man solle auch den Simulanten nicht darüber im Zweifel lassen, daß man über die Entstehung seines Hautleidens durchaus Bescheid wisse. Allerdings, die Erwartung, daß Rückfälle dann nicht mehr vorkommen würden, hat sich dem Autor bei entlarvten und selbst mit Strafe bedrohten Simulanten nicht in allen Fällen bestätigt. Unbedingt notwendig zur Prophylaxe der Selbstbeschädigung ist nach seiner Meinung im Kriege eine Zentralisierung aller damit behafteten Personen in besonderen Lazaretten, eine Forderung, die auch von *Gouin* aufgestellt wird und die, wie *Dacco* berichtet im italienischen Heere längst mit bestem Erfolg Verwirklichung gefunden hat. Wesentlich ist hierbei

noch, allen Simulanten möglichst jeden Urlaub zu versagen, da ein solcher, wie die Beobachtungen ergaben, meist eine Verschlechterung bezw. ein Neuauftreten des alten Leidens brachte. Schließlich ist auch dringend erforderlich, daß die Behandlung von Artefakten Fachärzten für Hautkrankheiten übertragen wird, die durch Erfahrungen und Fachkenntnisse auf diesem Gebiete zur raschen Erkennung und entsprechenden Bekämpfung dieses Übels die beste Eignung besitzen.

Bei den später beschriebenen, in der Universitäts-hautklinik Erlangen beobachteten Artefakten handelt es sich fast ausnahmslos um Fälle, die nach der eingangs dargelegten Einteilung *Brauers* der ersten Gruppe entsprechen, also durch eine anormale psychische Veranlagung, nämlich Hysterie, ausgelöst wurden. Es sei daher im weiteren auch diese Entstehungsart artefizieller Hautveränderungen einer eingehenderen Betrachtung gewürdigt.

Die Hysterie darf nach der Überzeugung der modernen Psychiatrie nicht mehr einfach als ein klinisches Krankheitsbild betrachtet werden, das sich wie eine innere Krankheit nach einzelnen Symptomen und Stigmen schildern und abgrenzen läßt, sondern die Hysterie stellt nach der neueren Lehre eine psychogene Reaktionsform dar. *Gaupp* betrachtet die Hysterie als eine abnorme Reaktionsweise auf die Anforderungen des Lebens. Als hysterisch bezeichnen wir nach *Kraepelin* eine nicht sehr scharf umgrenzte Gruppe von Störungen, deren gemeinsame Eigentümlichkeit ihre engen Abhängigkeitsbeziehungen zu Gemütsbewegungen bilden. Sie sind daher in der Hauptsache als Entladungen innerer Spannungen anzusehen, wenn auch meist auf merkwürdigen, dem gesunden Seelenleben nicht zugänglichen Wegen. *Kraepelin* unterscheidet hierbei im wesentlichen zwei Gruppen: Bei der großen Mehrzahl von Beobachtungen handelt es sich um jugendliche, namentlich weibliche Personen (Dienstmädchen, Kellnerinnen, Köchinnen, vorzugsweise ländlicher Herkunft), die nach unliebsamen Erlebnissen (Liebesenttäuschung, Streit, falsche Anschuldigung, Dienstkündigung) Erregungszustände oder Anfälle bekommen. Ihnen schließen sich Kinder an, bei denen nach körper-

lichen Erkrankungen, Züchtigungen oder durch Nachahmung einzelne hysterische Störungen zur Entwicklung gelangen. Diese Erscheinungen pflegen sich bei geeigneter Behandlung rasch zu verlieren, um sich vielleicht nach einigen Rückfällen jenseits des 25. Lebensjahres nicht mehr zu zeigen. Anders verhält sich ein kleiner Teil der im jugendlichen Alter erkrankenden Personen, der durch das ganze Leben die Neigung zu hysterischen Störungen behält, die dann bei langem Fortbestehen ganz abenteuerliche Formen annehmen können. Hier entwickelt sich vor allem eine Gewöhnung an die Krankheitserscheinungen, ja bisweilen deren triebartige, liebevolle Pflege, die das Leiden gewissermaßen zum Lebensberuf werden läßt. Der natürliche Wunsch nach Genesung wird durch das Bestreben in den Hintergrund gedrängt, die eigenen Beschwerden in möglichst grelles Licht zu stellen, um das Interesse der Umgebung auf sich zu lenken und sich dadurch ihre Hilfsbereitschaft dauernd zu sichern. So kommt es immer wieder zu Anfällen, zu Wehleidigkeit, Übertreibung der Klagen, ständigem Arztbedürfnis bisweilen mit Drängen nach operativen Eingriffen, endlich aber, wenn dies alles noch zu schwach erscheint, zur Vortäuschung von schwereren krankhaften Störungen (Fieber, Bluterbrechen, Harnverhaltung), oder gar zur heimlichen Selbstverletzung (Hautverätzungen u. s. w.). Meist immer finden sich dann bei solchen Personen schwere charakterliche Veränderungen als Ausdrucksformen einer Entartung, sodaß man daher bei diesen Fällen von einer „Entartungshysterie“ spricht.

Kraepelin weist weiter darauf hin, daß die bei der hysterischen Reaktion in Erscheinung tretenden körperlichen Stigmen vielfach Überreste alter Schutzeinrichtungen darstellen, wie wir sie bereits durch *Darwin* kennen gelernt haben. So deute z. B. der Selbstbeschädigungstrieb auf schwere Unzulänglichkeiten des Selbsterhaltungstriebes, insofern, als die natürlichen Regungen durch den Wunsch unterdrückt werden, die Krankheit als Waffe im Daseinskampf möglichst auszunützen! Nach den Feststellungen *Kraepelins* handelte es sich bei seinen weiblichen Hysterischen zum

großen Teil um Landmädchen. Dies sei daraus zu erklären, daß diese als jugendliche Dienstboten in die Großstadt verpflanzt, der Schwierigkeit dieses Milieuwechsels noch nicht gewachsen waren und die in diesen Fällen durch widrige Erlebnis- und Milieuwirkungen ausgelöste Hysterie sei beispielsweise als zufällige Instinktreaktion zu betrachten. Die Hysterie erweise sich demnach in erster Linie als eine Reaktionsform des unentwickelten, naiven Seelenlebens von stark instinktiver, triebmäßiger Struktur. Ihr Verschwinden mit zunehmendem Lebensalter habe seinen Grund zweifellos darin, daß die leichteren Pubertätsentwicklungshemmungen sich später meist doch noch ausgleichen und erst in dem Grade, als sich der Mensch vom Naturzustand und vom jugendlichen Alter entfernt, gewinnt die Hysterie den ausschließenden Charakter einer schwer krankhaften Abnormalität auf der Grundlage der Entartung.

Auch *Kretschmer* spricht sich im gleichen Sinne aus. Nach seiner Meinung sind die hysterischen Symptome entwicklungsgeschichtlich vorgebildete Reaktionsweisen des triebhaften seelischen Untergrundes. Hysterisch nennt er daher vorwiegend solche psychogenen Reaktionsformen, bei denen eine Vorstellungstendenz sich instinktiv, reflexmäßig oder sonst wie biologisch vorgebildeter Mechanismen bedient. Die hysterische Reaktion verhält sich zur menschlichen Normalreaktion, wie der Instinkt zum Intellekt. Bei der Hysterie lassen sich in dieser Hinsicht teilweise die Erscheinungen direkt als weiter entwickelte Ausdrucksform des bei niederen Tieren als abwehrmäßige Instinkthandlung bekannten Totstellreflexes deuten.

Eine Ansicht ähnlicher Art vertritt auch *Galant*. Er stellt nämlich eine Analogie auf, zwischen dem bei manchen Käfern Chrysomeliden, Cocainelliden und Vesikantien) beobachteten physiologischen Verteidigungsreflex, der darin besteht, daß das Insekt bei Berührung eine in seinem Blute zirkulierende, giftige Substanz nach außen entleert, und den als pathologischen Verteidigungsreflex zu wertenden Erscheinungen mancher Hysterischen, so z. B. der Stigmatisierten, die, um einen Schutzlismann zu besitzen, unbewußt

Hautblutungen arteficieller Art bei sich erzeugen, an den Stellen, die den Wunden des Gekreuzigten entsprechen.

Unter den gleichen Gesichtspunkten wie *Kraepelin* und *Kretschmer* die hysterische Reaktion im allgemeinen ansehen, sind natürlich auch alle Erscheinungen zu betrachten die während des Krieges bei Soldaten als Ausdruck einer Kriegshysterie oder Kriegsneurose so vielfach zur Beobachtung kamen. Hierbei bieten sich gerade auch hinsichtlich der Selbstbeschädigung oft erhebliche Schwierigkeiten bei der Entscheidung, ob eine echte hysterische Reaktion, oder eine raffinierte Simulation vorliegt; ja in manchen Fällen wird es direkt unmöglich sein, darüber ein sicheres Urteil zu fällen. Dies gilt nun nicht allein für die Kriegserscheinungen, sondern trifft auch sonst bei vielen gleichartigen Fällen zu und erklärt sich ganz allgemein einmal aus der großen Ausdehnung des menschlichen Affektlebens, weiter aus einer immerhin unscharfen gegenseitigen Abgrenzung der hier in Frage kommenden pathologischen psychogenen Reaktionsformen, nicht zuletzt aber aus dem uns überhaupt noch so schweren Einblick in seelische Vorgänge, die zur hysterischen Reaktion, bezw. auch zur Simulation führen.

Über die inneren Beweggründe zur Selbstbeschädigung, der sicherextremsten Ausdrucksform der hysterischen Reaktion, finden sich im Schrifttum die mannigfachsten Betrachtungen. *Rasch* hat die Erfahrung gemacht, daß die Kranken auf die Frage, weshalb sie die Läsionen hervorrufen, zuweilen antworten, sie müßten dies tun, eine unbezwingliche Lust überkäme sie. *Rasch* teilt in dieser Hinsicht die Meinung *Strümpels*, der die hysterischen Artefakte als eine vornehmlich im Unterbewußtsein der betreffenden Kranken vorgenommene Zwangshandlung anspricht. Auch *Bettmann* schließt sich dieser Ansicht an. *Towle* machte wiederholt folgende, im gleichen Sinne zu bewertende Beobachtung: Wenn solche Frauen erklären, daß sie die Hautveränderungen nicht selbst verursacht haben, so geschehe dies im allgemeinen im Bewußtsein vollster Wahrheit; denn sie führen diese Beschädigungen im Zustand ausgesprochener Amnesie durch. Als Ursache solcher Artefakte ließen sich häufig bestimmte

Unlustgefühle aufdecken. *Samuel* bezeichnet die Selbstbeschädigung bei Hysterischen ebenfalls als eine „unbewußte“ Handlungsweise. Die Läsionen, die gewöhnlich bei allein stehenden Mädchen zu beobachten seien, würden oft kompensatorisch für andere hysterische Phänomene eintreten und vielfach mit ihnen abwechseln. Sie wären dann ein physikalischer Ersatz für einen unterdrückten Gemütskomplex. Also, wenn auch unbewußt beigebracht, liege diesen Verletzungen doch eine bestimmte Absicht zugrunde. *Freud* hätte diese Handlungen vom unterdrückten sexuellen Instinkt hergeleitet.

In den Erörterungen, die sich an die ersten im Schrifttum veröffentlichten Fälle von hysterischen Artefakten anschließen, findet sich häufig die Anschauung vertreten, als habe man es mit primär durch die Hysterie hervorgerufenen Hautveränderungen zu tun. Man stößt dabei vielfach auf Bezeichnungen, wie „Hysterische Spontangangrän“ oder „Pemphigus hystericus“ im Hinblick auf das Vorkommen von pemphigusähnlichen Blasen. Letzteres erklärt sich nach *Frieboes* einfach daraus, daß eine Anzahl von Kranken, besonders weiblichen Geschlechtes, die ausgesprochene Neigung haben, auf alle möglichen Agentien hin, wie z. B. Essigsäure, mit Blasenbildung zu reagieren; so sei es ihnen teilweise gelungen, pemphigusartige Erkrankungen, teils mehr lokalisierter teils diffuser Art zu erzeugen, die großenteils auch erfahrene Ärzte irreführt hätten.

Als einer der ersten Autoren weist *Darier* auf das „definitive“ Ergebnis der neueren Untersuchungen hin, daß es eine hysterische Spontangangrän bzw. einen Pemphigus hystericus im eben erwähnten Sinne nicht gibt.

Im Gegensatz dazu sei jedoch ein 1922 von *Bolten* beschriebener Fall von „hysterischer“ Gangrän angeführt: Bei einem neuropathischen Mädchen entwickelte sich nach einer kleinen Verwundung ein markstückgroßes, tiefes, gangränöses Geschwür mit hysterischem Ödem des Handrückens ohne irgendwelche Zeichen von Entzündung. Bei dieser Kranken bestanden früher zahlreiche Störungen des vegetativen Nervensystems, wie Parästhesien in den Füßen

und Händen, asthmaartige Anfälle, Dysmenorrhoe und Urticariaanfalle; außerdem allerlei „vegetative“ Stigmata; starke Dermographie, Pulsus irregularis respiratorius, mäßig starker okulokardialer Reflex. Nach der Ansicht des Autors ist freilich manche hysterische Gangrän einer Selbstverstümmelung zuzuschreiben; aber eine tief lokalisierte Gangrän nach einem Trauma bei neuropathischen Personen sei meistens nicht künstlich. Es spiele hierbei nicht die Hysterie, sondern eine gleichzeitig vorhandene Vasomotoreninsuffizienz die Hauptrolle. *Bolten* glaubt, daß solche Gangränfälle als eine vasomotorisch-trophische Ausfallerscheinung betrachtet werden müssen.

Damit steht also den Artefakten differentialdiagnostisch ein freilich bis jetzt weder klinisch, noch ätiologisch hinreichend geklärtes Krankheitsbild gegenüber: „Die neurotische Hautgangrän“. Es ist darunter das Auftreten einer Gangrän zu verstehen, ohne daß eine äußere Schädlichkeit eingewirkt hat, oder ohne daß wenigstens die Noxe in einem entsprechenden Verhältnis zur Hautreaktion steht. Andererseits werden hierunter auch Hautnekrosen verstanden, welche in kausalgenetischer Beziehung zu greifbaren Veränderungen des Zentralnervensystems zu stehen scheinen. Im ersten Falle können nach den Forschungen von *Kreibich* Reizvorgänge am Gefäßnerven-Apparat pathogenetisch in Erwägung gezogen werden. Es tritt hierbei nach der Ansicht *Kreibichs* eine als Spätreflex zu deutende dilatatorische Hyperämie in Erscheinung, deren graduelle Steigerung zur Nekrose führen kann. Oder aber, es besteht, wie *Török* annimmt, eine toxische, auf die Blutgefäße unmittelbar wirkende Schädlichkeit, die eine analoge Reaktion am Zirkulationsapparat auszulösen vermag. So ist es nicht unwahrscheinlich, daß hämatogen-toxische und angioneurotische Faktoren nebeneinander sich auswirken und die Krankheits Symptome erzeugen. Im zweiten Falle liegen substantielle Veränderungen im Gehirn oder Rückenmark, in den Ganglien, oder in den peripheren Nerven vor und lassen in ihrer Lokalisation und Ausbreitung die trophische Hautveränderung selbstverständlich erscheinen. Dabei handelt

es sich meist um eine unmittelbare Alteration von Sympathikusbahnen. Der dadurch bedingte Ausfall verschiedener Funktionen spielt hier die Hauptrolle, indem nach den Ausführungen von *Mucha* durch Verlust von Sekretion, Gefäßinnervation, Empfindungsqualitäten, Gewebsernährung und durch sekundäre anatomische Gefäßerkrankung im Versorgungsgebiet die trophischen Gewebsalterationen bis zur Nekrose entstehen.

Es ist klar, daß in solchen Fällen die Differentialdiagnose Artefakt — Neurotische Gangrän Schwierigkeiten bereiten kann, denn wie auch *Jadassohn* betont, ist die Frage der Selbstverletzung — Hysterie — und des Nerveneinflusses (Kreibich) noch umstritten. *Babinski* meint, daß bei Hysterie zwar trophische Störungen vorkommen können, die nervösen Ursprunges sind; aber auf keinen Fall sei deren Ursache die Hysterie und er könne eine Gangrän hysterischen Ursprunges nicht anerkennen. Als Zeugen führt der Autor *Darier* an, der, wie schon oben dargelegt wurde, ebenfalls die Anschauung vertritt: Die Hysterie ist nicht imstande, trophische Hautveränderungen zu erzeugen. Auch *Desneux* spricht sich im gleichen Sinne aus. *Jadassohn* könnte, wenn er sich nur auf sein eigenes Material stützen wollte, die *Darier'sche* Darstellung gleichfalls unterschreiben. Er glaubt aber, daß uns die Beobachtungen von Kreibich und anderen doch eine gewisse Reserve auferlegen müßten; wenigstens hielten sie ihn persönlich von einem so absolut negierenden Standpunkt, wie ihn *Darier* vertrete, zurück. Wenn das Krankheitsbild der „Neurotischen Gangrän“ auch noch mancher Klärung bedarf, so muß es doch immerhin bei der hysterischen Selbstverletzung differentialdiagnostisch in Betracht gezogen werden. Die einwandfreie Diagnose „spontan entstandener“ Läsionen und somit eine bestimmte Abgrenzung von Artefakten ist nach *Mucha* erst durch exakte Krankenhausbeobachtung und Anlegung unverrückbarer und kontrollierbarer Schutzverbände möglich. Entstehen unter diesen neue Efflorescenzen oder zeigt sich die Heilungstendenz der bestehenden in keiner Weise beeinflußt, so kann Artefakt ausgeschlossen werden.

In ähnlicher Weise wie die neurotische Hautangrän, verdient weiter eine im letzten Jahrzehnt im Schrifttum mehrfach beschriebene Krankheitsform differentialdiagnostische Beachtung: „Die psychogenen Dermatosen.“ So ist es in dieser Hinsicht besonders bei hysterischen Kranken, deren artefizielle Hautveränderungen sich als schwerste Kratzeffekte erweisen, angebracht, die Mitteilungen von Sack in nähere Erwägungen zu ziehen. Sack veröffentlicht elf Fälle von Dermatosen auf psychogener Grundlage. Er stellte bei verschiedenen mit Ekzemen und Urticaria behafteten Kranken eine eindeutige Abhängigkeit des Krankheitsbildes von emotionellen Reizen, vielfach sexueller Natur fest. Dies gelte nach seiner Meinung besonders auch für den Pruritus. Er geht dabei von der Annahme aus, daß die Haut übersät sei mit „Reizrezeptoren“. Bei ihrer exponierten Lage seien Reizungen in größerer oder geringerer Intensität immer vorhanden und infolgedessen auch die pruriginösen Sensationen; dagegen sei die Vividität, d. h. das Aufmerksamkeitsquantum, das für sie zur Verfügung gestellt wird, in der Regel so gering, daß sie unbewußt verarbeitet würden. Werde dagegen die Straffheit der logischen Zusammenhänge und die Behauptung einer zielstrebigem Aufmerksamkeitserichtung gelockert und gestört, wie dies beispielsweise im Ermüdnungszustand, oder bei senilen und psycholabilen Menschen der Fall sei, so könnten sich unerwünschte, verdrängte und unerledigte Affekte, ebenso wie sonst übersehene Empfindungen dazwischen schieben. So sei auch die Entstehung von Juckreiz und Kratzen zu erklären. Besteht hierbei noch ein verdrängter Komplex, z. B. sexueller Natur, so komme es gleichzeitig zu dessen Lösung — zum Orgasmus. Der Autor berichtet von zwei weiblichen Kranken, die durch wildes Kratzen einen Orgasmus auszulösen imstande waren. Er erinnert bei dieser Gelegenheit an *Demokrit* von Abdera, der schon im Altertum diese Beobachtung gemacht habe: *Ευόμενοι άνθρωποι ἴδονται καὶ σπιν γίγνεται ὡς περ τοῖσι ἀφροδισιάζουσι.* (Das Kratzen beim Jucken bereitet Wollust, die sich zum Orgasmus steigern kann!).

Auch *Bunnemann* berichtet von seinen Beobachtungen über psychogene Dermatoßen zweier Kranken. Es handelte sich um Schwellungen mit Blutaustritten und um furunkelähnliche Gebilde. *Bunnemann* konnte durch suggestive und hypnotische Beeinflussung die Prozesse rasch zum Verschwinden bringen, aber auch wieder hervorrufen. Er erklärt die psychogene Entstehung solcher Dermatoßen auf die Weise, daß die Kranken unter dem Einfluß einmal erlebter, besonders eindrucksvoller Erlebnisse an ihrer Haut Erscheinungen hervorbringen, die mit ihren Erlebnissen in Zusammenhang stehen. Der Autor versucht dies durch die bei beiden Frauen in Hypnose erzeugten Hauterscheinungen zu beweisen, die er als äußeren Ausdruck früherer Erinnerungsbilder ansieht, ausgelöst durch eine Assoziation zweier Komplexe. So assoziierte z. B. bei der einen Kranken ein Erinnerungsbild aus ihrer Jugend — ein bei einem Raufhandel blutüberströmter Mann — mit der Erinnerung an die öfters erlebte drohende Haltung ihres Mannes und es entstanden an ihrer Haut Schwellungen mit Blutaustritten. Bei der anderen Kranken waren furunkelähnliche Gebilde an der Haut entstanden, deren erste Eruption anlässlich einer Pocken Schutzimpfung erfolgte, und vielleicht dadurch zu erklären war, daß bei der Kranken eine ursprüngliche Angst vor luetischer Infektion sich mit der Angst vor einem weiteren Import von Giftstoffen ins Blut assoziiert hatte. In ähnlicher Weise glaubt *Bunnemann* auch an die psychogene Entstehung eines Fluor albus. Er konnte einen solchen bei der zuletzt erwähnten Kranken durch Hypnose völlig und dauernd beseitigen. Nach seiner Ansicht kommen hysterische besonders leicht in derartige Gefühlslagen und projizieren dann Erinnerungsbilder auf ihre Haut. Er bezieht sich bei seinen Ausführungen auf die Philosophie *Vaihingers*: Nicht das was ist, so wie es ist, ist im instinktiven, organischen Getriebe von Wirkung, sondern das, was sein könnte, was einem fiktionalen Urteile entspricht.

Die ersten Publikationen über hysterische Artefakte finden sich im englischen Schrifttum. *E. Wilson* hat das Krankheitsbild als „Neurotic excoriation“ in seinen „Lec-

tures on diseases of the skin“ 1874—1875 beschrieben, wollte aber nicht glauben, daß die Läsionen vom Kranken selber hervorgebracht wurden. Dies ist später von *Living* und *Colcott Fox* bewiesen worden. Letzterer beobachtete 1882 bei einem 16 jährigen, hysterischen Mädchen eine Menge oberflächlicher Excoriationen an den verschiedensten Körperstellen. Trotzdem er überzeugt war, daß die Kranke selbst die Affektion hervorrief, konnte er zunächst auch bei Anstaltsbeobachtung nicht ermitteln, in welcher Weise das geschah. Erst wie er dem Mädchen seine Vermutung direkt auf den Kopf zusagte, gestand daselbe, daß es sich die Wunden selbst beigebracht habe, teils mit den Nägeln, größtenteils aber durch fortwährendes Reiben mit den Fingerspitzen.

In Deutschland war *Strümpell* der erste, der 1892 seine in der Erlanger Medizinischen Klinik erhobenen Beobachtungen über schwere Selbstbeschädigung bei einer Hysterischen veröffentlichte. Da dieser Fall das Krankheitsbild der hysterischen Artefakte und dessen Verlauf in direkt klassischer Form darstellt, sei die folgende Wiedergabe eine ausführlichere und getreueere: Die 26 jährige Babette W. war am 15. Februar 1890 in die Erlanger Medizinische Klinik ärztlich eingewiesen worden mit der Angabe, daß es sich wahrscheinlich um einen sehr merkwürdigen, äußerst interessanten Fall von sogenannter „spontaner Gangrän“ handle. Nach Aussage des Arztes bestand das Leiden schon seit neun Jahren und zwar in der Weise, daß bald an den Armen, bald an den Beinen, zuweilen auch im Gesicht, ohne jede nachweisbare Veranlassung umschriebene Rötung und Schwellung der Haut auftraten und dann nach Verlauf weniger Tage in eine ausgesprochene Gangrän übergingen. Aus der von der Kranken selbst erhobenen Anamnese ging hervor, daß eine nervöse Erkrankung in ihrer Familie nicht bestand. Sie selbst war bis zum 17. Lebensjahr immer gesund. Etwa ein Jahr später bekam sie den ersten „schwarzen Fleck“ an der Wange, welchem später in verschiedenen langen Zwischenpausen die anderen Flecke gefolgt seien. Vier Jahre zuvor hatte die Kranke Zwillinge

geboren, die aber bald nach der Geburt wieder starben. Während der Schwangerschaft und auch ein Jahr lang nach der Geburt traten keine kranken Stellen an der Haut auf. Seit neun Jahren, im Anschluß an eine Lungenentzündung, litt sie bald seltener, bald häufiger an Anfällen (zuweilen 6--7 mal an einem Tage), wobei sie bewußtlos zu Boden stürzte und dann in Krämpfe verfiel.

Als die Kranke nach ihrer Aufnahme in die Klinik von *Strümpell* untersucht wurde, war nur an der Außenseite des linken Unterschenkels eine etwa handtellergroße Ulceration vorhanden mit brandigem, übelriechenden Grund. Dieses Geschwür bestand angeblich schon seit einigen Wochen. Frische Stellen der Erkrankung waren nirgends sichtbar, dagegen war die Haut beider Beine, beider Arme und der rechten Wange durch ausgedehnte, alte, strahlige, zum Teil hypertrophische Narben entstellt, ähnlich wie man sie etwa nach geheilten, schweren Verbrennungen sieht. Sonstige krankhafte Erscheinungen wurden an dem übrigen blassen, schlecht genährten, geistig wenig regisamen Mädchen zunächst nicht beobachtet. Vier Tage später war früh mit einem Male auf der Haut in der Mitte der linken Wade eine etwa handtellergroße Stelle bemerkbar, welche leicht geschwollen war, eine etwas fleckige Rötung und auf dieser eine Anzahl kleiner Bläschen zeigte. Am Abend desselben Tages hatte die Entzündung noch zugenommen und in der Mitte der oben beschriebenen Stelle fand sich bereits eine beginnende, grüngelbe, brandige Verfärbung der Haut. Die Kranke klagte über etwas Brennen an der entzündeten Stelle und äußerte sich zugleich, sie würde wahrscheinlich „jetzt auch ihren Anfall bekommen“. Und richtig kurz darauf trat derselbe ein — ein typischer, hysterischer Krampfanfall mit Verdrehung der Augen nach oben, Streckung des Rumpfes und heftigen, schlagenden Bewegungen in Armen und Beinen. Der Anfall hörte bald wieder auf. Am folgenden Tage war auch am linken Vorderarm eine etwa talergroße, stark entzündete Hautstelle entstanden. Nun schöpfte *Strümpell* Verdacht auf hysterische Artefakte. Abends, als die Kranke schon im Bett lag, ging er unver-

mutet zu ihr, führte sie selbst direkt aus dem Bett im Hemde in ein anderes Zimmer, wo sie eingeschlossen wurde. Dann wurden ihre Sachen und ihr Bett genau untersucht, und — im Bett versteckt fand sich ein großes Stück Äthnatron! Als dieses der Kranken gezeigt wurde, gestand sie auch nach einigem Zureden, daß sie sich damit selbst seit Jahren die Geschwüre beigebracht hätte.

Strümpell machte zum Überfluß mit dem Äthmittel auch noch selbst an der Kranken einen Versuch in der Weise, daß er mit dem etwas angefeuchteten Stück eine kleine Hautstelle einrieb. Es entstand daselbst nach kurzer Zeit genau die gleiche Dermatitis, wie an den anderen frisch erkrankten Stellen und *Strümpell* zweifelte nicht im mindesten daran, daß man durch wiederholtes Äthen auch hier ein tiefes, brandiges Geschwür hätte hervorbringen können. Bemerkenswert erschien ihm der Umstand, daß die Kranke nach dieser Entdeckung gar keine besondere Verlegenheit oder Beschämung zeigte. Sie verblieb in ihrem gewöhnlichen, stupiden Verhalten und erst auf wiederholtes Fragen, zu welchem Zwecke sie sich denn in dieser Weise verletzt hätte, antwortete sie: „Weil es mich immer in der Haut so juckte“. Wie *Strümpell* bei der Kranken noch feststellen konnte, bot sie außer einer sehr beträchtlichen Abstumpfung des Geschmacks (Chinin schmeckte ihr „nach gar nichts“) auch eine beträchtliche Analgesie der Haut dar. Man konnte ihr allenthalben eine aufgehobene Hautfalte mit einer Nadel ganz durchstechen, ohne daß sie die geringste Schmerzäußerung laut werden ließ. Daß diese Analgesie die eigentümlichen Manipulationen der Kranken erleichterte, ist, wie *Strümpell* meint, klar. Nach Auffinden des Äthnatrons traten bei der Kranken keine neuen Hautentzündungen mehr ein und die alten heilten prompt ab. Über den inneren Beweggrund der Kranken zu dieser Selbstbeschädigung glaubt *Strümpell*, daß vielleicht die Sucht „sich interessant zu machen“ von dem Zeitpunkt mit im Spiele gewesen sein könnte, als sie bemerkte, daß ihrem Zustand besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Im wesentlichen aber ist *Strümpell*, wie schon erwähnt, der Ansicht, daß die hysterischen Arte-

fakte eine Art Zwangshandlung darstellen, die meist im Unterbewußtsein hervorgerufen würden und mit allerlei krankhaften Vorstellungen (z. B. religiösen Wahnideen u.a.) verbunden seien.

Rasch berichtet über einen 1912 beobachteten Fall von sogenannter hysterischer Dermatoſe folgendes: Ein 17jähriges Mädchen vom Lande war seit über zwei Jahren mit einem Hautleiden behaftet, das schon von verschiedenen Ärzten unter verschiedenen Diagnosen behandelt wurde. Von der letzten Dienststelle, wo die Kranke sich aufgehalten hatte, wurde mitgeteilt, daß sie schwach begabt sei und große Unlust zur Arbeit zeige. Sie bleibe unter verschiedenen Vorwänden gerne zu Bette liegen und gebe an, sich im Bette am wohlsten zu befinden. Die Hautaffektion soll in den beiden letzten Jahren fast ständig in stärkerem oder geringerem Grade vorhanden gewesen sein. Die Kranke, die verschlossen und zurückhaltend war, und einen Anstrich von Eigensinn und mürrischem Wesen zeigte, bot ein sehr merkwürdiges Aussehen dar: Ihre Haut war in großer Ausdehnung von zusammen ungefähr 150 streifenförmigen Exkorationen, oder pigmentierten Flecken, als Folgezustand derselben, von in der Regel 6—7 cm Länge und 1—2 cm Breite bedeckt. Der größte Teil derselben fand sich auf der Vorderfläche des Körpers und der Glieder, eine geringere Anzahl am Geſäß und in der Regio lumbalis, während der Rücken und die Rückseite der Glieder nahezu frei waren. An den verschiedenen Körperteilen hatten sämtliche Flecken eine bestimmte Richtung, indem sie untereinander sogut wie parallel liefen. So waren sie am Unterleibe in Querrichtung, auf der Innenſeite der Schenkel schräg von unten innen nach oben und außen, an der Außenſeite der Schenkel parallel mit der Längsachse gerichtet. Die Stellen waren teils mehr oder minder lebhaft gerötet, teils rotbraun pigmentiert; auf einem Teil derselben saßen eingetrocknete, dünne, teilweise blutgefärbte Schorſe, die leicht entfernt werden konnten. Der Rücken war vom Angulus scapulae aufwärts vollständig frei; daselbe galt von der Vorderſeite der Schienbeine und den Füßen. Die

Untersuchung des nervösen Verhaltens der Haut zeigte folgendes: Die Kranke reagierte in keiner Weise auf Stecknadelftiche, gleichviel, wo und wie tief sie gestochen wurde. Die Analgesie schien somit eine totale zu sein. Schlund- und Cornealreflexe waren vorhanden. Die übrige Untersuchung ergab nichts Abnormes. Während des Aufenthaltes in der Klinik erschien nur ein einziges Mal, nach einem kleinen Streit mit der Krankenpflegerin ein kleiner, neuer Streifen auf der rechten Wange; sonst zeigten sich jedoch keine neuen Hautveränderungen. Die alten Stellen wurden blässer und blässer und heilten völlig ab. Am Entlassungstage wurde die Kranke beiseite genommen und gefragt, auf welche Weise sie eigentlich die Streifen hervorbrächte. Erst wollte sie nicht antworten, als ihr jedoch versprochen wurde, der Krankenschwester auf der Stube nichts davon zu erzählen, teilte sie mit, daß sie die Streifen hervorbrächte, indem sie mit dem Daumen, der mit einer dicken und harten Oberhaut versehen war, an der betreffenden Stelle fest hin und her riebe. Gleichzeitig demonstrierte sie ihre Methode ad oculos. Die Frage, weshalb sie dies täte, wollte sie nicht beantworten.

Einen weiteren in mancher Hinsicht bemerkenswerten Fall von artefizieller Kutisnekrose hatte *Riecke* Gelegenheit zu beobachten: Ein 20 jähriges sonst gesundes Mädchen, aus stark psychisch belasteter Familie stammend, litt seit etwa acht Jahren an einem hartnäckigen, scheinbar jeder Behandlung trotzens Hautleiden des Gesichtes, das in Gestalt von schorf- und krustenbedeckten Stellen, von roten und rotbraunen Flecken in unregelmäßiger Formgestaltung verlief. Primäreffloreszenzen einheitlicher Art waren nicht festzustellen. Unter den Krusten und Schorfen traten mehr oder weniger tiefgreifende Epithel- und Kutisdefekte zutage. Keine subjektiven Störungen begleiteten diese Erscheinungen. Die verschiedenartigsten Heilverfahren versagten. Eine in klinischer Beobachtung durchgeführte völlige Abdeckung der Gesichtshaut mittels eines einfachen sterilen Mullcolloidverbandes führte zur restlosen Abheilung aller frischeren und älteren entzündlichen Erscheinungen. Objektiv

wichtige Merkmale für die Diagnosestellung Artefakte waren der Mangel an typischen Primärefflorescenzen, die Regelmäßigkeit in Verlauf und Anordnung der Herde, die Formdifferenzen und insbesondere die ungleichmäßige Tiefe der Defekte und das Ausbleiben von Folgeerscheinungen bei so langjährigem Bestande. Dazu kam ein offenbar pathologischer Einschlag hinsichtlich der psychischen Veranlagung. Ein stark exaltiertes Wesen, ein oft unmotiviert sich einstellender Erregungszustand, ein mit unermüdlicher Konsequenz und einer gewissen Leidenschaftlichkeit immer wiederholtes Jammern über den beklagenswerten Zustand, das nie von Weinen begleitet war, endlich ein gewisser Hang nach Einsamkeit waren in dieser Richtung gleichfalls bemerkenswerte Erscheinungen. Besonders beweiskräftig aber für die Auffassung des vorliegenden Krankheitsbildes als eines Artefaktes spricht *Riecke* den Erfolg der Behandlung an, d. h., die glatte Abheilung unter Okklusivverbänden. Ihren endgültigen Beweis erhielt die Diagnose durch die Überführung der Kranken. Bei unmittelbarer Beaufsichtigung konnte festgestellt werden, daß sie ihre Hautveränderungen durch Kratzen mittels der Fingernägel erzeugte. Aber auch schon die Art der Defekte und Narben in ihrem schrägen Verlauf, ihrer dreieckigen, ovalen und sonst unregelmäßig länglichen und seitlich verzogenen Gestaltung hätte nach der Meinung des Autors auf diesen Mechanismus beim Zustandekommen der Hautveränderungen schließen lassen. Merkwürdig erschien bei der Kranken noch das völlige Fehlen einer Hypästhesie oder Anästhesie der Haut; denn die Kraftentfaltung, welche aufgebracht werden muß, um auf intakter Haut so tiefgreifende Läsionen zu erzeugen, ist beträchtlich und löst normalerweise lebhafteste Schmerzempfindung aus. *Riecke* glaubt daher, daß mangels hysterischer Stigmata eine psychische Deviation bei der Kranken wohl sicher angenommen werden muß, zumal irgendwelche Beweggründe sozialer oder sonstiger Art nicht in Betracht kamen.

Cubero beobachtete folgende, durch eine hysterische vorgetäuschte, ulceröse Veränderungen: Ein 18 jähriges

Mädchen erschien im Ambulatorium mit der Angabe sie hätte durch einen Schlag Wunden erlitten, die zwar nicht schmerzten, aber nicht zuheilen wollten. Es fanden sich am rechten Unterarm und Schenkel Hautläsionen, die nicht durch einen Stoß entstanden sein konnten, sondern wie Verätzungen ausahen. Keine Besserung trotz verschiedener Behandlung. Auffallend war die Heiterkeit der Kranken, die bei neuerlicher Untersuchung wieder typische, durch ein Ätzmittel hervorgerufene Ulcera zeigte. Die Kranke hatte keinen Rachenreflex und eine herabgesetzte Schmerzempfindlichkeit. In die Enge getrieben gestand sie, sich die Verätzungen selbst durch Lauge zugefügt zu haben. Darauf prompte Heilung.

Fischer erwähnt Beobachtungen über Artefakte bei einer gleichzeitig an Mesenterialdrüsentuberkulose leidenden Kranken: Seit einigen Tagen zuerst an der linken Wange plötzliches Auftreten von oberflächlichen Nekrosen und nässenden Stellen am Rumpf, die in ihrer Begrenzung, Form und klinischem Aussehen den Eindruck von Artefakten machten; befallen waren nur Stellen, die mit der rechten Hand zu erreichen waren; man sah deutliche Zeichen von Scheuern und von Verätzungen (linke Wange). Ursache angeblich unbekannt. Infolge ihres Leidens zeitweilig Abusus von Narkoticis. Hysterische Symptome waren nicht vorhanden, aber Neigung, sich interessant zu machen mit genitaler Betonung (Forderung häufiger vaginaler Untersuchungen u. ä.).

Ein weiterer typischer Fall von hysterischer Selbstbeschädigung mit einem auffallenden klinischen Bild wird von *Polland* veröffentlicht: Die Kranke, eine 26 jährige Magd, gab an, in letzter Zeit einige Male Krampfanfälle erlitten zu haben, wobei sie bewußtlos zu Boden gefallen sei. Seit vier Wochen hätten sich unter heftigem Juckreiz braune Flecken und Geschwüre auf der Haut gebildet; diese seien ganz von selbst entstanden, sie habe nie irgendwelche Manipulationen an der Haut vorgenommen. Das hervorstechendste Charakteristikum dieser Hautaffektion bildeten 5—10 cm lange, ca. 1 cm breite, stark pigmentierte Streifen,

die fast durchwegs zu zwei oder drei parallel angeordnet waren, im übrigen aber in den verschiedensten Richtungen verliefen und sich stellenweise sogar überkreuzten. Sie fanden sich am ganzen Körper mit Ausnahme jener Stellen, die den Fingern unerschbar waren und des Gesichtes. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, daß man es hier mit oberflächlichen Narben zu tun hatte und zwar verschiedenen Alters; dementsprechend repräsentierten sich auch die frischesten dieser „Efflorescenzen“, die sich über den Brüsten fanden, tatsächlich als noch mit Blutkrusten bedeckte, stellenweise tief ins Corium reichende, streifenförmige Substanzverluste. Nach Beschaffenheit und Anordnung dieser Phänomene konnte wohl kein Zweifel darüber herrschen, daß es sich um ungewöhnlich energische Kratzeffekte handeln müsse. Das ergab sich aus der den Fingern entsprechenden parallelen Anordnung der Streifen, ihrer Verschmälerung an beiden Enden und vor allem aus der Richtung der einzelnen Streifengruppen, die genau der Richtung entsprach, in der man die einzelnen Körperpartien zu kratzen pflegt und wobei die nicht leicht erreichbaren Stellen frei geblieben waren. Hingegen sah man an solchen Stellen, die für beide Hände gleich leicht erreichbar sind, z. B. an der Brust und der Kreuzbeingegend, die Streifengruppen sich überkreuzen. Die Kranke blieb beharrlich bei der Angabe, daß die Affektion von selbst entstanden sei. Die frischen Kratzwunden heilten rasch ab; neue erzeugte sie während der Beobachtung nicht. Die Erklärung zu der Frage, woher die Kranke den Heroismus nahm, ihre Nägel so tief in die Haut zu schlagen, ergab sich aus der Untersuchung des Nervensystems. Hierbei fand sich neben anderen typischen Zeichen der Hysterie eine ausgebreitete, sehr starke Herabsetzung der Schmerzempfindung der Haut; man konnte ihr an allen möglichen Stellen Nadeln tief hineinbohren, ohne daß sie die geringsten Abwehrbewegungen machte. Sie hatte also auch beim Kratzen offenbar keinerlei besondere Schmerzempfindung. Mit dieser Beobachtung decken sich die Feststellungen von *Strümpell* und *Frieboes*. *Polland* erachtet es nun bei seinem Falle für wahrscheinlich, daß die

an starken Juckanfällen leidende Kranke genötigt gewesen sei, sehr heftig zu kratzen, um durch eine andere Empfindung den Juckreiz zu übertäuben. Man könne es sich gut vorstellen, daß es ihr selbst gar nicht so vorkam, als ob sie besonders heftig gekratzt hätte, da sie eben nichts spürte.

Einen hinsichtlich der Pathogenese interessanten Fall von hysterischen Artefakten beobachtete *Buschke*: Ein 20 jähriges Mädchen zeigte seit 3 Monaten auf dem rechten Handrücken ein ziemlich ausgedehntes Geschwür, zum Teil noch mit nekrotischer Epidermis. Aspekt ähnlich wie nach Carbolätzung. Schwere Hysterica. Unter festem Verband Heilung. Eine besondere Beachtung erschien bei dieser Kranken deshalb angezeigt, da sie Linkshänderin war und sich daraus die Lokalisation der Selbstbeschädigung am rechten Handrücken erklärte.

Aus neuerer Zeit sei noch eine Veröffentlichung von *Ganzoni* erwähnt. Er berichtet über drei Fälle von sicheren Artefakten, wovon zwei zugegebenermaßen mit konzentrierter Salzsäure erzeugt wurden. Im dritten Fall blieb die Ursache unaufgeklärt: offenbar psychopathische Kranke, die sich aus wahrscheinlich erotischen Motiven große Ätzwunden am Unterbauch und auf der Vorderseite der Oberschenkel beigebracht hatte.

Wie weit sich die Grenzen für den Begriff „Artefakt“ ziehen lassen, sei aus einer freilich etwas fernliegenden, aber immerhin beachtenswerten Feststellung von *Frieboes* ersichtlich. Darnach kann unter Umständen auch einmal eine Idiosynkrasie, sofern der Kranke sich seiner Überempfindlichkeit bewußt ist, der Selbstbeschädigung dienen und zu einer Täuschung des Arztes verwendet werden. Derartige Hautauschläge seien dann jederzeit als Artefakte anzusprechen.

Zusammenfassend läßt sich über das klinische Bild der Artefakte sagen, daß es, entsprechend den so verschiedenartigen zur Selbstbeschädigung verwendeten Mitteln, einen sehr mannigfaltigen Charakter trägt. So lassen sich denn auch die einzelnen Symptome unmöglich alle in ihren Einzelheiten schildern. Neben einfachen Verfärbungen können

Hautblasen, Aetzschorfe und tiefgehende Ulcerationen, ja sogar eine weitgehende Gangränä cutis vorliegen. Gleichzeitig können auch sekundäre ekzematöse Veränderungen das klinische Bild verwischen und damit die Diagnose erschweren. Von Wichtigkeit ist immer die Gestaltung der Herde, vor allem die Ungleichmäßigkeit der Hautzerstörungen in Bezug auf Form und Tiefe. Neben runden können eckige, polygonale, längliche Defekte vorliegen, neben breiten, schmale, neben langen, kurze. Die Ränder können zwar scharf umschrieben und glatt sein, oft aber sind sie auch buchtig, und ganz regellos gezahnt. Man kann weiter sehr häufig beobachten, daß bei dem Aufbringen einer ätzenden Flüssigkeit auf die Haut in die Umgebung versprühte Tropfen zu kleineren Nekrosen führen. Vielfach kommt es auch an der Haut zum Herablaufen von Tropfen der aufgetragenen Aetzflüssigkeit, was dann zu charakteristischen, strichförmigen Rötungen und nach Abklingen der Entzündung zu strichförmigen Pigmentationen führt. (*Frieboes*). *Frieboes* gibt als ein weiteres, bisweilen zu beobachtendes Merkmal des klinischen Bildes strichförmige, sich kreuzende Veränderungen in der Nähe des Hauptherdes an, welche dadurch bedingt sind, daß durch das verwendete Agens starker Juckreiz ausgelöst wird und die Kranken dann mit beiden Händen kratzen, wobei die Aetzflüssigkeit in dieser strichförmigen Anordnung über die Haut verwischt wird. Auf solche sich kreuzende, strichförmige Hautveränderungen ist auch in dem oben angeführten Fall von *Polland* hingewiesen. Diese akzidentellen, immer auf Artefakt deutenden Symptome werden allerdings von raffinierten Personen, die eine gewisse Fertigkeit in der Selbstbeschädigung erreicht haben und durch frühere Entlarvungen gewarnt sind, meist vermieden. Das klinische Bild des Artefaktes weist oft gewisse Merkmale auf, aus denen unter Umständen auf die zur Erzeugung verwendeten Mittel geschlossen werden kann. So verursachen z. B. rauchende Salzsäure und Salpetersäure gelbe, Schwefelsäure durch Verkohlungen schwarze Schorfe, von einem derben, lederartigen Charakter. Durch ätzende Pflanzen werden in der Regel weißliche Schorfe gebildet.

Laugen pflegen schmierig-weiche, feuchte, ebenfalls weißlich verfärbte Schorfe hervorzurufen, die bisweilen zu recht tiefreichenden Hautgeschwüren führen können. Freilich die Zahl der chemisch wirkenden Mittel ist so groß, und die Art ihrer Wirkung doch verhältnismäßig so wenig grundsätzlich verschieden, daß man von vornherein nur sehr selten ein bestimmtes Mittel mit Sicherheit anschuldigen kann.

Neben den eben angeführten charakteristischen Merkmalen des klinischen Bildes kann für eine künstlich herbeigeführte Hautveränderung weiter ihre Lokalisation bezeichnend sein. Es sind nämlich meist die Gegenden der Haut befallen, welche mit den Händen leicht erreicht werden können, sodaß die Vorderfläche des Körpers vornehmlich der Sitz solcher Veränderungen ist. Die rückwärtig gelegenen Körperpartien dagegen bleiben in der Mehrzahl der Fälle frei. Einen oft als typisch für Linkshänder angesprochenen Befund soll das mit Krankheitserrscheinungen bevorzugte Befallensein der rechten Körperhälfte bilden. Wenn sich dies auch in vereinzelt Fällen feststellen läßt, so wird man es doch wohl kaum verallgemeinern dürfen, vor allem nicht dahingehend, daß sich bei Rechtshändern dann die Hauterscheinungen mehr auf der linken, wie auf der rechten Seiten finden. An dieser Stelle sei auch nochmals an eine vielfach zu beobachtende unterschiedliche Lokalisation der Hautveränderungen bei Hysterischen und Simulanten erinnert, die darin besteht, daß die Hysterischen, um aufzufallen und Interesse zu erregen Gesicht, Hände, Brüste und Genitalregion bevorzugen, während die Simulanten eine jeweilig ihrer Absicht zweckdienlich erscheinende Körperstelle zum Sitz der Artefakte wählen.

Die Diagnose Artefakte läßt sich also wie eben dargelegt, häufig aus dem klinischen Bild und der Lokalisation der Erscheinungen stellen. Oft erhellt sie auch schon beim Erheben der Anamnese aus den meist gar nicht mit dem klinischen Bild im Einklang stehenden und daher sofort als unglaublich erscheinenden Angaben der Kranken. In Zweifelsfällen kann man auf das Vorliegen einer Selbstbeschädigung auch aus der Behandlung schließen, d. h. aus

dem glatten Abheilen der Hautveränderungen unter Okklusivverbänden, durch die dem Kranken eine weitere absichtliche Reizung der betreffenden Stellen unmöglich gemacht wird. Allen Schwierigkeiten, welche die Diagnosestellung bei Artefakten früher gemacht hat, läßt sich leichter begegnen, seit *Brauer* mit seinen Hinweisen auf die für Selbstbeschädigungen charakteristischen Merkmale direkte, im folgenden wiedergegebene Leitsätze für die Diagnose der Artefakte aufgestellt hat:

1. Jede spontan entstandene Krankheit hat in Bezug auf ihre Ursache etwas Logisches, Natürliches, innerlich Berechtigtes. Vorgeschichte, Aussehen und Verlauf der absichtlich erzeugten Hautaffektion lassen auf den ersten Blick diese Logik vermissen, erscheinen unmotiviert und unerklärlich.

2. Als Lokalisation sind die Stellen beliebt, an denen schon früher eine Erkrankung bestanden hatte.

3. Die Kranken geben auf Befragen Ursachen an, die zu dem vorliegenden Bild durchaus nicht passen. Eine ersichtliche Entstehungsursache fehlt jedoch, z. B. bei Unterschenkelgeschwüren das Vorhandensein von Lues, Tuberkulose, Varicen.

4. Die drei Stadien jeder Hautaffektion: Entwicklung, Höhepunkt, Rückbildung sind fast nie vorhanden. Meist sieht man die Affektion erst im Höhepunkt.

5. Auffällig ist eine Stereotypie der Erscheinungen, die zurückzuführen ist auf die immer gleichartige Anwendung des gleichen Mittels von dem einzelnen Kranken. Alle Artefaktbilder zeigen außerdem noch eine innere Ähnlichkeit: Man findet nämlich in der Hauptsache nur immer Blasen und Nekrosen bzw. Geschwüre.

6. An den Affektionen selbst ist typisch die scharfe Begrenzung und die bizarre Gestalt. Oft bestehen hochgradige, akut entzündliche Erscheinungen mit lokalisierter Temperaturerhöhung, frischer Rötung, frisch entzündlicher Schwellung bei Affektionen, die angeblich mehrere Jahre alt sind. Die Verschlimmerung solcher Veränderungen erfolgt nie in Form einer regelmäßigen Vergrößerung, son-

dern durch Apposition oder Superposition und zwar dann, wenn das Geschwür beinahe abgeheilt war.

In fast gleicher Weise wie *Brauer* macht *Carpintero* zur Erleichterung der Diagnose vorgetäuschter oder künstlich unterhaltener Dermatoßen auf bestimmte Anhaltspunkte aufmerksam, die bei fraglichen Hautveränderungen stets beachtenswert erscheinen: Darnach soll man den Kranken immer bei Tageslicht gründlich untersuchen und dabei überlegen, ob die angegebenen Krankheitsursachen dem klinischen Bilde entsprechen. Ferner ist es wichtig, ohne bei dem Kranken Verdacht zu erwecken, sich nach den verschiedenen Phasen der Hauterkrankung und den von ihm selbst angewandten Mitteln zu erkundigen. Wenn irgend möglich soll ein Kranker mit unglaublichen Angaben isoliert und scharf beobachtet werden. Für die Diagnose derartiger arteficieller Dermatoßen sei folgendes ausschlaggebend: 1. Welchen Erfolg hat der Kranke durch die Simulation? 2. Negativer Erfolg sämtlicher bakteriologischer Untersuchungen. 3. Mehrfache Widersprüche des Kranken bei der Erhebung der Anamnese. 4. Rasche Heilung bei strenger Überwachung. 5. Häufiges Recidivieren und Wechseln der klinischen Symptome. 6. Beobachtung des Kranken ohne sein Wissen.

Was die Differentialdiagnose bei den arteficiellen Hautveränderungen betrifft, so kommt hier neben der „Neurotischen Hautangrän“ und den „Psychogenen Dermatoßen“, die im vorstehenden bereits einer eingehenden Betrachtung gewürdigt wurden, ganz besonders noch ein weiteres Krankheitsbild in Betracht, das Gegenstand vieler Streitfragen geworden ist, die *Dermatosis dysmenorrhoeica symmetrica*. Es handelt sich dabei um eine im Jahre 1912 von *Matzenauer* und *Polland* beschriebene, eigenartige Hautaffektion, deren charakteristische Merkmale kurz folgende sind:

1. Sie tritt nur beim weiblichen Geschlecht auf, und zwar meist bei jungen Mädchen bald nach der Pubertät.

2. Die Menstruation ist bei den Kranken überhaupt noch nicht aufgetreten, oder bald von sehr langen Menopausen unterbrochen worden, sehr unregelmäßig und spärlich.

3. Das Wesen der Hauterscheinungen besteht im raschen Auftreten von Hautnekrosen aller Grade, die stets ihren Ausgang von den Follikeln der Haut nehmen und sich in Gestalt verschieden großer Herde von Streifen- oder Fleckenform präsentieren, die fast stets an symmetrischen Hautstellen auftreten.

4. Nach der jeweiligen, bei den verschiedenen Fällen sehr wechselnden Intensität des Prozesses kommt es an den befallenen Stellen zu verschieden starken Zerstörungen der Haut, die von einer einfachen Abschuppung der Hornschicht oder blasenförmigen Abhebung der Epidermis bis zur vollkommenen Nekrose der ganzen Cutis sich steigern können.

5. Infolgedessen bleiben sehr oft mehr oder weniger starke Narben zurück.

6. Der Verlauf ist sehr chronisch und kann sich in immer wieder auftretenden Nachschüben jahrelang hinziehen.

7. Mit dem Eintreten einer normalen Genitalfunktion hört der Prozeß auf.

8. Bei einigen Fällen zeigten sich gewisse Anomalien des Geisteslebens, offenbar psychogener Natur, die mit den Menstruationspsychose wahrscheinlich in eine Reihe zu stellen sind.

9. Die Ursache der Erkrankung ist eine abnorme Funktion der Ovarien; es kommt dadurch zu parenteralem Zerfall von Ovarialeiweiß, welches im Blute kreist und so die Dermatose veranlaßt.

10. Therapeutisch scheint daher die systematische Darreichung von organischen Ovarialpräparaten einen günstigen Einfluß auf den Prozeß auszuüben.

Das Krankheitsbild der Dermatitis dysmenorrhoeica symmetrica ist ein sehr viel umstrittenes, demgegenüber verschiedene Autoren, wie besonders *Rasch* und *Brauer* einen völlig ablehnenden Standpunkt einnehmen. Sie glauben, daß es sich bei diesen Hauterscheinungen lediglich um Artefakte handle. Daß jedoch diese Anschauung eine irrige ist, wird durch *Eckardt* in einer Arbeit aus unserer Klinik eindeutig klargestellt unter Hervorhebung der hauptsäch-

lichsten Unterschiede zwischen Artefakten und der Dermatitis dysmenorrhoeica symmetrica:

Brauer gibt als auffallende Eigenschaft der Artefakte an, daß von den drei sichtbaren Stadien jeder Hautaffektion, der Entwicklung, dem Höhepunkt und der Rückbildung, bei den absichtlich erzeugten Hautkrankheiten fast niemals das erstere wahrnehmbar ist, sondern meist schon das Bild auf seinem Höhepunkt in Erscheinung tritt. Diese Beobachtung *Brauers* wird niemand als für Artefakte charakteristisch anzweifeln. Bei der D. d. s. trifft sie jedoch nicht zu; denn wiederholt gelang es *Matzenauer* und *Polland*, sowie anderen Autoren die Entstehung der symmetrischen Efflorescenzen unterm Uhrglas genau zu beobachten. Da auch unter feststehenden Schutzverbänden Efflorescenzen auf vorher intakter Haut entstanden, läßt sich die exogene Ätiologie mit Sicherheit ausschließen.

Als „merkwürdig“ bezeichnet *Brauer* die oft scharfe, geradlinige Begrenzung der künstlich erzeugten Hauterkrankungen, die zur Bildung von unmöglich natürlich bedingten geometrischen Figuren (Vierecken, usw.) führt, oder ihre ebenfalls bizarre Gestalt, die sie von vornherein verdächtig erscheinen läßt, oft nicht minder die Lokalisation der Erkrankung am Körper und der Einzelerrscheinungen zueinander, die die allgemeinen Regeln nicht respektieren. Fast immer liegen die Efflorescenzen im Bereich der Hände. Demgegenüber betont *Polland* bei der D. d. s. als typisch „das rasche Auftreten von Hautnekrosen aller Grade, die stets ihren Ausgang von den Follikeln der Haut nehmen und sich in Gestalt verschieden großer Herde von Streifen- und Fleckenform mit kleinpolyzyklischer, rosenkranzartiger Begrenzung, als ob sie aus einer Anzahl kleinster, herpetischer Blasen entstanden seien, präsentieren und fast stets an symmetrischen Hautstellen auftreten“. Also auch hier ein wesentlicher Unterschied zwischen Artefakt und D. d. s.

Außerdem macht *Brauer* darauf aufmerksam, „daß Störungen des Gesamtorganismus, wie sie mehr oder minder bei Pemphigus oder pemphigoiden Erkrankungen vor-

kommen, bei solchen an (künstlichen) bullösen Eruptionen leidenden Personen ebenso regelmäßig fehlen, wie irgendwelche lokale Prodromalerscheinungen vermißt werden. Es sei denn, daß die Wunde der Ausgang einer Wundinfektion wird“. Auch in diesem Punkte scheidet sich die D. d. s. scharf vom Artefakt. Finden sich doch — von Menstruationsanomalien ganz zu schweigen — gleichzeitig mit den Hauterscheinungen meist Störungen von seiten der Kreislauforgane und des Herzens, nicht selten auch psychische Störungen, während die Kranken in der Regel an der betreffenden Hautstelle vor dem Auftreten der Efflorescenz zunächst ein Brennen verspüren, dessen Intensität allerdings ziemlich starken Schwankungen unterworfen ist.

Eckardt stellt fest: Aus diesen von *Brauer* selbst zur Erkennung von Artefakten aufgestellten Leitätzen sei ohne weiteres ersichtlich, daß sie bei der D. d. s. nicht zutreffen. Somit habe *Brauer* seine eigene Behauptung, „daß die D. d. s. den Stempel des Artefakts an der Stirne trage“ selbst widerlegt.

Zur gleichen Frage spricht sich *Hauck* an Hand des in unserer Klinik beobachteten Falles von D. d. s. allgemein dahingehend aus, daß nach den so genau und sorgfältig durchgeführten Beobachtungen nicht der geringste Zweifel mehr bestehen könne, daß es sich bei den von *Polland* angeführten Krankheitsfällen um eine spontane Entstehung der krankhaften Hautveränderungen handelt.

Die Dermatitis dysmenorrhoeica symmetrica hat, wenn auch früher vielfach verkannt, heute wohl einen dauernden Platz als selbständiger Krankheitstyp unter den Hautkrankheiten erlangt.

Zum Abschluß dieser allgemeinen Betrachtungen über Artefakte, ihre Diagnose und Differentialdiagnose, sei nun auch ganz kurz nochmals auf die Behandlung eingegangen. Diese ist äußerst einfach, denn es gelten bei ihr, um wieder auf *Brauer* zu verweisen, die Regeln der allgemeinen Wundbehandlung. Bei geschwürigen Defekten ist zuerst die Anwendung halbfleuchter Verbände zu empfehlen, unter denen eine gute Reinigung und Granulation der ulcerierten Stellen

erfolgt. Hat man dies erzielt, so kann die Weiterbehandlung mit Salbenverbänden einsetzen. Hierbei ist es aber wichtig, sämtliche erkrankte Stellen vor neuerlichen, absichtlichen Insulten der Kranken zu schützen und ihnen daher jegliche Berührungsmöglichkeit der Krankheitsherde unmöglich zu machen. Dies läßt sich durch absolut feststehende Verbände, am besten mit Steifgaze erreichen. Ein promptes Abheilen der Artefakte unter solchen Schutzverbänden ist als direkt charakteristisch anzupprechen. Allerdings muß man beim Anlegen dieser Verbände äußerst korrekt vorgehen; denn wie *Crippa* mitteilt, weiß sich der raffinierte Kranke auch aus solchen für ihn unliebsamen Lagen oft zu helfen. Unter dem noch feuchten Verband, z. B. am Unterschenkel, läßt er seine Muskeln spielen; wenn es ihm möglich ist, geht er auf und ab, stellt sich auf die Zehen; wenn er vorsichtshalber zu Bett gebracht, aber nicht genügend beaufsichtigt ist, so bewegt er den Fuß so extrem wie nur möglich. Durch diese Manipulationen bezweckt und erreicht er eine Dehnung des Verbandes, sodaß derselbe dann, erstarrt, nicht enge den Unterschenkel umschließt. Nun fährt er mit einem feinen Stäbchen zwischen Verband und Haut von oben nach unten durch, befestigt unten mit einem Faden ein Leinwandläppchen, das er mit einer reizenden Substanz getränkt hat, bringt es durch Zurückziehen des Stäbchens an die gewünschte Stelle, läßt das reizende Mittel nach seiner Erfahrung entsprechend lang wirken und entfernt dann dasselbe durch völliges Herausziehen. Bei Öffnung des Verbandes bietet sich dann die unangenehme Überraschung, statt der erwarteten Besserung eine Verschlimmerung des krankhaften Zustandes vorzufinden. Geht der Verband auch über den ganzen Fuß, sodaß er mit seinem Unterschenkel wie in einem gutstehenden Stiefel steckt, so bemüht sich der Betrüger, solange der Verband feucht ist, eine möglichst unnatürliche Fußhaltung einzunehmen, bis der Verband fest geworden ist. Wenn er nun den Fuß nicht mehr in der unnatürlichen, verdrehten Stellung hält, sondern in die normale Lage zurückgehen lassen will, so kann das der Fuß nicht und es reizt jetzt der nun festgewordene

Verband die Haut des Fußes an der den normalen Verhältnissen des Fußes nicht passenden Stelle.

Um den Heilungsprozeß vor solchen böswilligen Störungen durch die Kranken zu sichern, ist daher beim Anlegen der Verbände so zu verfahren, wie es von *Brauer* angegeben wird. Darnach soll bei einem Befallensein des Fußes, oder der Knöchelgegend der ganze Fuß in den Verband hineinbezogen werden. Bei Unterschenkelaffektionen soll der feste Verband bis über die Mitte des Oberschenkels gehen, damit dem Kranken die Möglichkeit genommen, oder doch erschwert wird, durch Drehbewegungen des ganzen Verbandes den Heilungsprozeß zu stören; auch darf die Polsterung nicht zu dick sein, da sonst von den Verbandenden aus die Wunde leichter zugänglich wird und Instrumente und Reizmittel aller Art eingeführt werden können. Zu all dem ist noch eine strenge Überwachung bezw. Isolierung der betreffenden Person — eine Forderung von *Carpintero* — unerlässlich. Es ist weiter nach Möglichkeit eine von *Strümpell* und *Brauer* mit Erfolg geübte Maßnahme anzuwenden, nämlich die sofortige Durchsuchung von Kleidern und mitgebrachten Gegenständen der Kranken nach etwaigen Reizmitteln. Hat man Erfolg und findet auf diese Weise die auslösende Ursache der Selbstbeschädigung, so steht damit schon von vornherein die Diagnose fest. Auch in unserer Klinik wird diese Methode angewendet und hat sich bewährt.

Für den allgemeinen Umgang mit solchen Personen erscheinen endlich noch die Ratsschläge von *Rasch* beachtenswert, der besonders bei Kranken mit hysterischen Artefakten ganz allgemein folgendes empfiehlt: Wenn eine derartige Kranke in die Klinik kommt, könne man zu ihr sagen, daß ihr Hautleiden nicht gefährlich sei, daß es recht häufig vorkomme und daß man es gut kenne. Es sei den Ärzten und den Pflegerinnen zu verbieten mit der Kranken über ihre Krankheit zu sprechen, oder sie mehr als notwendig zu untersuchen. Man könne ihr weiter sagen, daß ihr Bewegung gut tue, und lasse sie deshalb an der Arbeit in der Abteilung teilnehmen. Bei diesem Verfahren

werde in der Regel die Kranke bald aufhören, sich weiter Läsionen beizubringen. Je mehr Interesse man diesen Kranken zeige und je häufiger man sie untersuche, desto mehr neue Veränderungen brächten sie sich bei. Durch gründliche „wissenschaftliche“ Untersuchung und Behandlung könne man ihren Klinikaufenthalt bis auf mehrere Jahre verlängern. Es sei nutzlos, die Kranken, gleich wenn man sie sehe und besonders im Beisein anderer zu fragen, ob sie sich selbst die Läsionen beibrächten. Sie würden dies immer leugnen und die Frage wirke oft direkt schädlich, indem die Kranken dann dadurch irritiert, sofort neue Hauterscheinungen auslösen würden. Wolle man die Wahrheit erfahren, so könne man das nur, wenn man die Kranke kurz vor der Entlassung beiseite nehme und sie ohne Beisein von Zeugen ausfrage. Man müsse auch vermeiden, im voraus einen Tag für ihre Entlassung aus der Klinik zu bestimmen, da man sich dann meist auf neue Läsionen am Tage vor dem bestimmten Datum gefaßt machen könne, falls die Kranke nämlich Luft verspüre, noch längere Zeit im Krankenhaus zu bleiben. Die Entlassung müsse daher plötzlich, ohne vorherige Ankündigung bestimmt werden.

Hat man bei einer Kranken zwar alle sicheren Zeichen für eine Selbstbeschädigung festgestellt, aber noch kein umfassendes Geständnis der betreffenden Person erhalten, dann kann man ein solches oft auf eine schon von *Colcott Fox* geübte Art herbeiführen, daß man nämlich der Kranken bei ihrer Entlassung ihre Handlungsweise direkt auf den Kopf zusagt. *Frieboes* glaubt, man habe damit auch häufig eine Möglichkeit, weitere Selbstbeschädigungen zu verhüten. *Brauer* allerdings muß auf Grund seiner Erfahrungen feststellen, daß diese Art von Prophylaxe nicht geeignet ist um Recidiven in allen Fällen und dauernd vorzubeugen.

Es ist selbstverständlich und wird auch von den verschiedensten Autoren ausdrücklich betont, daß hier immer eine entsprechende psychische Beeinflussung des Kranken einsetzen muß. Natürlich darf die Diagnose Artefakt erst dann gestellt werden, wenn klinisch, oder durch Auffinden

des Substrates, mit dem der Artefakt erzeugt wird, der Fall absolut sichergestellt ist. Aber auch wenn man seiner Sache sicher ist, meint *Frieboes*, solle man unter Umständen, namentlich wenn es sich um junge Mädchen handelt, außerordentlich vorsichtig sein in der Art, wie man besonders die Mutter oder sonstige Angehörige und Verwandte darüber aufklärt; denn mit Strafen oder Bloßstellen der Tatsache in Bekanntenkreisen erreiche man meistens gerade das Gegenteil von dem, was man erhoffe. Es müsse die Aufgabe des Arztes sein, die nächsten Familienangehörigen wohl zu verständigen, aber auch dafür zu sorgen, daß diese Kenntnis nach außen nicht in Erscheinung trete, um so denen, welchen man psychisch helfen wolle, die peinliche Situation der Scham und der Verhänjelung zu ersparen; erst dann könne man sie wieder zu normal handelnden Menschen machen. Daß bei den aus Rentenjucht erzeugten Artefakten der Simulanten eine versicherungstechnische Ablehnung solcher Schäden die beste Prophylaxe für die häufigen Recidive bildet, kann *Ganzoni* nur beigestimmt werden.

Nach diesen allgemeinen Ausführungen über Artefakte seien nun in folgenden 25 Fälle von Selbstbeschädigungen der Haut beschrieben, die von 1925—1934 in der Universitäts-Hautklinik, Erlangen zur Beobachtung gelangten. Bei 7 Fällen, die zuerst angeführt seien, konnte das die Hautveränderungen auslösende Agens ermittelt werden. Bei den übrigen Kranken war dies teilweise unmöglich, oder aber die Ursache ließ sich nur vermuten; doch sprachen hier die meist unglaublichen Angaben der Betreffenden, wie auch alle klinischen Erscheinungen eindeutig für die Diagnose.

Fall 1.

Eva G., 10jährige Schülerin.

Anamnese: Vor 5 Monaten Beginn der Erkrankung angeblich mit einer Rötung des rechten Unterarmes und zum Teil mit Bildung von Eiterpusteldien. Gleichzeitig trat eine Schwellung der rechten Hand auf, die nicht mehr verging und aller ärztlichen Behandlung trotzte.

Allgemeinbefund: Mittelgroßes, kräftig entwickeltes Mädchen mit frischer Gesichtsfarbe. An innereren Organen und Nerven[system] sind krankhafte Veränderungen nicht festzustellen.

Lokalbefund: Rechte Hand, die Hautfarbe ist etwas blaß, sonst nicht verändert. Am Handrücken starke oedematöse Schwellung, sodaß Fingereindruck lange bestehen bleibt. An der Handwurzel, besonders gut auf der Volarseite ausgeprägt, findet sich ein ca. 1 mm breiter, ganz leicht vertiefter, unauffälliger Streifen circular um das Handgelenk verlaufend. Die Hand wird von der Kranken in schonender Stellung gehalten; die rohe Kraft ist dabei stark herabgesetzt. Sonst ist der Körper frei von oedematösen Stellen. Am rechten Unterarm einzelne Pyodermieherdchen.

Diagnose: Oedem des rechten Handrückens mit Pyodermien. Verdacht auf Artefakt.

Behandlung: Die Pyodermien werden mit Schwefelpaste behandelt; außerdem erfolgt Ruhigstellung der Hand.

Wegen des Verdachtes einer arteficiellen Strangulation der Hand durch die Kranke, Anlegen eines Steifgazeverbandes; dazu genaue Überwachung, die bereits in der ersten Nacht zu einer Bestätigung des Verdachtes führt:

Es wird der Kranken eine Hanfchnur abgenommen, wobei sie gesteht, daß sie mittels dieser Schnur monatelang in unbewachtem Zustande die Hand abgechnürt habe.

Krankheitsverlauf: Nach drei Tagen Abnahme des Verbandes. Das Oedem der Hand ist vollkommen abgeklungen. Die rohe Kraft ist gut, soweit eine etwaige Verstellung der Kranken einzurechnen ist.

Die Kranke wird entlassen. Ihre Selbstschädigung der rechten Hand stellt ein ihr wohl gelungenes Mittel dar, sich dadurch den unliebsamen schriftlichen Arbeiten in der Schule zu entziehen.

Fall 2.

Marie, B., 16jähriges, lediges Lehrmädchen.

Anamnese: Vor 14 Tagen sei plötzlich „über Nacht“ die Haut am Grundglied des rechten Mittelfingers aufgebrochen und dann in gleicher Weise auch an den übrigen Fingern derselben Hand, sowie am rechten Unterarm. Vor 8 Tagen begann der gleiche Vorgang am linken Handrücken und griff auf den linken kleinen Finger, den Mittelfinger und den linken Vorderarm über. Seit vier Tagen zeigen sich dieselben Erscheinungen am rechten Unterkiefer. An allen Stellen bestehe anfänglich Hitzegefühl, dann Juckreiz. Vom Arzt sei mit Quecksilbersalbe behandelt worden. Menarche mit 14 Jahren; Meneses normal. Sonst immer gesund.

Allgemeinbefund: junges, kräftiges Mädchen in gutem Ernährungszustand. Innere Organe zeigen keinen krankhaften Befund. Nerven|system in Ordnung, Rachenreflex vorhanden.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Befund: Es finden sich 2—3 cm lange und 1 cm breite Hautläsionen an beiden Händen und Vorderarmen folgendermaßen lokalisiert: Rechte Hand, am Grundglied des Mittelfingers und kleinen Fingers, sowie Mittelglied des Ringfingers, dorsal gelegen, am Grundglied des Zeigefingers auf der Medianseite und über dem Mittelhandknochen des Daumens.

Linke Hand, auf dem Handrücken, lateral am Grundglied des kleinen Fingers, sowie lateral und medial am Grundglied des Mittelfingers.

Vier ähnliche, aber größere Hautläsionen befinden sich auf der Streckseite des rechten Unterarmes und eine eben solche Stelle ist auf der Beugeseite gelegen.

Eine gleiche Veränderung zeigt ferner die Streckseite des linken Vorderarmes und die rechte Seite des Unterkiefers.

Diagnose: Artefakte.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die Kranke leugnet anfänglich hartnäckig sich diese Hautveränderungen selbst beigebracht zu haben. Nach einigen Tagen jedoch gibt sie zu, daß sie sich mit Salzsäure aus der Autogarage ihres Bruders „angestrichen“ habe. Sie wollte wegen Familienzwistigkeiten einmal von zu Hause fortkommen.

Unter Desitinverbänden heilen die Läsionen glatt und rasch ab, mit zurückbleibenden roten Flecken. Die Kranke wird mit entsprechender Mahnung arbeitsfähig entlassen.

Fall 3.

Margarete W., 16jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Die Mutter der Kranken befindet sich in einer Heil- und Pflegeanstalt.

Die Kranke selbst wurde vor einem Jahr wegen akuter Blinddarm-entzündung operiert. Wie der behandelnde Arzt mitteilte, war der Heilverlauf der kleinen Schnittwunde ein glatter. Nach einigen Wochen jedoch brach die Wunde aus unerklärlichen Gründen wieder auf, näßte und war nicht mehr zur Heilung zu bringen. Gleichzeitig stellte sich ein schmetterlingsförmiger, erysipelartiger Ausschlag des Gesichtes ein, der durch die üblichen therapeutischen Maßnahmen zwar prompt zurückging, aber ebenso prompt wieder auftrat. Die Laparotomiewunde ist bis heute noch nicht geschlossen. Alle Untersuchungsmethoden den Fall ätiologisch zu klären, waren erfolglos und der Arzt stehe daher vor einem Rätsel.

Die Meneses bestehen seit dem 12. Lebensjahr in 14 tägigen Intervallen und dauern ca. 6 Tage.

Allgemeinbefund: Leidlicher Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Außer sehr lebhaften Reflexen kein krankhafter Befund.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: Beide Wangen sind stark gerötet; auf der rechten Seite gelbbraunlicher Krustenbelag von der Größe eines Dreimarkstückes. Über dem rechten Jochbogen findet sich ein ebensolcher kleinerer Herd von Linsengröße. In der rechten Unterbauchgegend, zwei Querfinger unterhalb des Nabels findet sich ein pflaumengroßes, 1 cm tiefes Ulcus mit schmierig, eitrig belegtem Grund.

Diagnose: Artefiziell chronisch irritierte Appendixnarbe; Artefakte im Gesicht.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die ulcerierte Appendektomie-narbe wird zunächst mit Alkoholverbänden behandelt, die Erscheinungen im Gesicht mit Tumenolpasta.

Auf eine Tuberkulinprobe mit Koch-Alt-tuberkulin 1:100 000 tritt an der Injektionsstelle keine Reaktion auf, dagegen Fieberreaktion bis 39,6°. Die Kranke wird aber bei einer mehrmals erfolgten Nachprüfung der Temperaturen einer sicheren Temperaturfälschung oft bis 40,2° überführt. Die alte Laparotomienarbe ist eines Tages mit einer grünlichen Farbe beschmierig und läßt sofort irgend eine artefizielle Manipulation erkennen. Die weitere Behandlung mit Byrolin[albe erfolgt daher unter festanliegenden Heftpflasterverbänden, worauf eine rasche Besserung des Ulcus eintritt. Auf diesen günstigen Heilungsvorgang reagiert die Kranke wiederholt mit passivem Verhalten gegen Nahrungsaufnahme und muß unter Aufsicht essen. Auch mittelstarkes Nasenbluten, wie Bluten aus dem Mund lassen mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen, daß artefizielle Ursachen dazu Anlaß gaben. Das Ulcus heilte unter der angegebenen Behandlung völlig ab. Auch im Gesicht ist in derselben Zeit eine weitgehende Besserung eingetreten; doch lassen sich hier verschiedentlich neue Exkoriationen beobachten. Bei einem genauen Verhör gesteht die Kranke, ihre Wunde immer mit „Puder“ (Salz?) „behandelt“ zu haben, weil sie dachte, daß Puder „heilt“! Bezüglich der grünen Färbung, die während der Behandlung an Verband und Wunde festgestellt worden war, gibt sie nach zunächst ausweichenden Antworten endlich zu, daß sie dieselbe mittels eines Tintenstiftes herbeigeführt habe. Schließlich legt sie auch noch ein Geständnis dahingehend ab, die Veränderung im Gesicht durch Kratzen und Reiben selbst erzeugt zu haben.

Die *Diagnose* Artefakt ist dadurch eindeutig klargestellt.

Die Kranke wird geheilt entlassen.

Fall 4.

Babette F., 28 jährige, ledige Arbeiterin.

Anamnese: Seit 5 Jahren ist die Kranke „nervenleidend“. Es bestehen Kopfschmerzen, vorwiegend in der linken Schläfengegend, außerdem Reißen in beiden Beinen und Abgeschlagenheit. Vor einem Jahr sei zum ersten Male am rechten Handrücken eine eiternde Stelle auf-

getreten, die sich dann weiter ausgebreitet habe, aber von selbst wieder abgeheilt sei. Vor vier Monaten erneutes Auftreten der Eiterung an gleicher Stelle und seit 10 Tagen auch an der Brust, sowie am linken Unterkiefer. Anfänglich bestünden rote Flecken, aus denen sich dann erst die eiterigen Stellen bildeten. Die Kranke will dieses Leiden auf Sonnenbestrahlung zurückführen.

Mit 15 Jahren erstes Auftreten der Menfes, die immer unregelmäßig seien.

Allgemeinbefund: Mittlerer Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex und Cornealreflex fehlen. Dermographismus negativ.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: Auf der rechten Brustseite, oberhalb der rechten Mamma, finden sich mehrere punkt- und tropfenförmige, wie mit einem Pinjel hingemalte, erodierte Stellen, die mit gelben Schorfen bedeckt und von einem entzündlich geröteten Hof umgeben sind. Am rechten Unterschenkel, handbreit über dem Malleolus internus, befindet sich ein 10 cm langes und 2 cm breites Geschwür, ebenfalls mit gelblichen Schorfen bedeckt und mit entzündlich geröteten Rändern, die sich von der Umgebung scharf begrenzt abheben. Auf der Dorsalseite der rechten Hand, in einem vom Zeigefinger bis zum kleinen Finger sich erstreckenden, gleichfalls scharf umschriebenen Bezirk ist die Haut narbig verändert und dunkelbläulich verfärbt. Dazwischen finden sich zwei mit braunem Schorf bedeckte Stellen, wie sie an Brust und rechtem Unterschenkel beschrieben sind.

Diagnose Artefakte ergibt sich ohne weiteres aus diesem klinischen Bild.

Behandlung und Krankheitsverlauf: An der Brust erfolgt Behandlung mit Byrolin[albe. Die Ulcerationen am rechten Unterschenkel werden zuerst mit feuchter Kammer behandelt und nachdem sie sich darunter weitgehend geschlossen haben, erfolgt Weiterbehandlung mit Destin[albe. Da wiederholt beobachtet wird, wie die Kranke durch Reiben eine Verschlechterung herbeizuführen sucht, wird an der Brust ein Mastisolverband, am Fuß ein Steifgazeverband angelegt, worunter eine glatte Abheilung erzielt wird. Eines Tages können bei der Kranken neue Efflorescenzen festgestellt werden, in Gestalt von Blasen in der Interdigitalfalte zwischen Daumen und Zeigefinger an beiden Händen. Sie will sich die Blasen beim Kehren und Reinemachen des Kranken[saales zugezogen haben; man kann sich aber bei der symmetrischen Anordnung der Blasen des Gedankens an ein neues arteficielles Trauma nicht erwehren. Die Kranke gesteht schließlich bei einem eingehenden Verhör, daß sie sich alle Hautveränderungen, sowohl an der Brust wie am rechten Unterschenkel und an beiden Händen durch Verätzen mit Säure selbst beigebracht habe. Der Grund zu solchem Handeln ließ sich nicht ermitteln. Zur Bestätigung der Diagnose genügte dies Geständnis. Die Kranke wird geheilt entlassen.

Fall 5.

Babette Sch., 33 jährige, ledige Landwirtstochter.

Anamnese: Vor 2 Jahren Verbrühung des linken Vorderarmes mit kochendem Wasser. Trotz sofortiger ärztlicher Behandlung habe sich sechs Wochen darnach „Wundrose“ eingestellt, die den linken Ober- und Unterarm, sowie die linke Hand in ganzer Ausdehnung befiel, auf die Brust und den rechten Arm übergriff und zu gleicher Zeit auch am linken Ober- und Unterschenkel auftrat. Die Erkrankung habe bis zur völligen Ausheilung fast ein halbes Jahr gedauert. Nach etwa einem Jahre seien nun plötzlich die alten Narben am linken Unterarm wieder aufgebrochen; auch sei an denselben Stellen, wie im Vorjahre abermals Wundrose aufgetreten und zwar von noch größerer Intensität und Ausbreitung. Krankenhausbehandlung habe nur eine geringe Besserung der Wundrose gebracht. Der Arm sei weiterhin „offen“ geblieben und es seien hier an der Haut stets neue, sehr große Blasen, aus denen sich eine trübe Flüssigkeit entleerte, entstanden. Diese Stellen hätten dann eine lange Zeit bis zur Abheilung gebraucht. Erst vor einem Monat sei eine völlige Heilung des Armes erfolgt, sodaß sie wieder arbeiten hätte können, was seit der Verbrühung nicht mehr der Fall gewesen sei. Seit drei Wochen jedoch sei der ganze linke Arm erneut aufgebrochen. Fieber habe sie nicht gehabt. An den befallenen Hautstellen bestehe Brennen, Juckreiz und heftiger Schmerz bei jeder Berührung. Gleichzeitig wird über Schmerzen in allen Gelenken geklagt, die schon seit der Verbrühung bestünden. Voriges Jahr angeblich starke Rötung und Schwellung des linken Fußgelenkes. In der letzten Zeit viel Kreuzschmerzen.

Menarche 15 Jahren; Menfes immer unregelmäßig, mit Schmerzen und starken, oft 6—7 Tage dauernden Blutungen. Kein Ausfluß.

Allgemeinbefund: Große, kräftige Kranke in gutem Ernährungszustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex fehlt! Dermographismus negativ. Im übrigen normaler Befund.

Hautbefund: Der linke Arm weist in seiner ganzen Ausdehnung Krankheitsherde und in deren Bereich starke Schwellung und Rötung auf. An den befallenen Stellen stößt sich die alte Epidermis, verfärbt von einer dunklen Salbe, in größeren Fetzen ab; die darunter befindliche frische Epidermis ist hochrot verfärbt, stark glänzend und gespannt. Am Ellenbogen, sowie in dessen nächster Umgebung am Unterarm haftet die alte, dunkel verfärbte Epidermis noch fester, läßt sich nicht abziehen und zeigt zwischen hinein feststehende, flache Krusten. Alle Herde sind scharf, aber unregelmäßig begrenzt und zwischen ihnen finden sich Flächen vollständig gesunder Haut. An der Streckseite des Oberarmes geringe Blasenbildung.

Die durch Schwellung des Armes bedingten Maßunterschiede sind folgende:

	Mitte	12 cm vom proc. uln. nach oben gemessen	7 cm distal vom Ellenbogen gemessen
	cm	cm	cm
Linker Oberarm	28,0		
Rechter Oberarm	27,2		
Linker Unterarm		25,8	
Rechter Unterarm		24,0	
Linker Unterarm			27,3
Rechter Unterarm			26,3

Auf der Streckseite des linken Oberarmes findet sich außerdem noch ein Narbenkeloid in Größe von 1:1,5 cm, über dessen Entstehung die Kranke keine Angaben macht; die Stelle habe geeitert und sei voriges Jahr „von selbst“ aufgetreten.

Am rechten Arm, in dessen oberem Drittel, sieht man zur Hälfte auf der Streckseite, zur Hälfte auf der Beugeseite gelegen braune Pigmentierungen, die auf die rechte Schulter und Achselhöhle übergreifen und einen unregelmäßigen Charakter, besonders hinsichtlich der Intensität aufweisen.

Auf der Brust befinden sich fünf längliche, 5:2—3 cm große, schwach, aber deutlich pigmentierte, gelbbraunliche Flecken. Ein ebensolcher, größerer Flecken greift vom oberen rechten Brustbereich auf die rechte Schulter über, wo er mit der oben beschriebenen Oberarm- und Achselhöhlenpigmentation confluiert.

Der linke Oberschenkel zeigt an der Streckseite im unteren Drittel, bis an den oberen Rand der Patella reichend, ebenfalls unregelmäßige Pigmentationen mit Zwischenräumen von gesunder Haut, die teilweise livid verfärbt ist. Die Veränderungen grenzen gegen die Patella zu ziemlich scharf ab.

An der Beugeseite des linken Unterschenkels ist die Haut in einem etwa markstückgroßen Bezirk leicht bräunlich verfärbt, ohne jedoch eine Erhabenheit aufzuweisen. Ebenso erstreckt sich lateral über eine etwa doppelhandtellergröße Fläche eine leichte, unregelmäßige Pigmentierung der Haut.

Über dem rechten Fußrücken bzw. Fußgelenk sind zwei kleinere Narben zu sehen; hier sei die Kranke vor sechs Jahren wegen Sehnen-scheidenentzündung zweimal geschnitten worden.

Auch am Rücken, der Hüft- und Glutäalgegend finden sich noch etwa 12 verschieden große, pigmentierte Narben, die auf eine vor drei Jahren durchgemachte Furunkulose zurückgeführt werden.

Nach diesem ganzen Befund läßt sich zusammenfassend sagen, daß eine besondere, von der früheren Verbrühung am linken Arm herrührende Narbenbildung nicht festgestellt werden kann. Auch widerspricht sich die Kranke des öfteren und vor allem ihre Angaben über den Umfang der

Verbrennung sind sehr wechselnd. Bald gibt sie an, der ganze Arm sei betroffen gewesen, dann bezeichnet sie wieder nur eine etwa 15 cm lange und 5 cm breite Stelle auf der Streckseite des Unterarmes als die verbrühte. Hieraus, sowie aus dem ganzen Krankheitsbild mit den meist scharf abgegrenzten Erscheinungen, nicht zuletzt aber aus einem einwandfrei hysterischen Gebahren der Kranken, erwächst, zumal auch der Rachenreflex nicht unlösbar ist, der sichere Verdacht auf Hysterie und Artefakte!

Behandlung und Krankheitsverlauf: Lassarpastenverbände am linken Arm im Wechsel mit Moronalkompressen. Außerdem wird Strepto-Yatren in Dosen von 0,5 und 1,0 gegeben. Gute Heilungstendenz. Am vierten Tage nach der Klinikaufnahme kann bei der Kranken ein Neuauftreten von Krankheitsherden beobachtet werden: auf der Streckseite des linken Oberarmes, im oberen Drittel, findet sich eine 7 cm breite und 4,5 cm hohe, hochrote, quaddelähnlich erhabene Stelle, die angeblich über Nacht entstanden sei. Sie ist unregelmäßig begrenzt, hebt sich aber scharf von der umgebenden Haut ab. Nach mehreren Stunden weist dieser Herd, der nunmehr etwas livide verfärbt ist, mehrere stechnadelkopf- bis linsengroße Bläschen auf und ist von einem 2—3 mm breiten, hellroten Saum umgeben. Im Laufe des gleichen Tages weiterer, neuer Herd an der Außenseite des rechten Oberarmes, unterhalb des M. deltoideus bis zur Ellenbeuge sich erstreckend. Er ist intensiv gerötet und gleichfalls leicht erhaben; die Grenzen sind nach medial etwas unscharf, verschwommen, nach lateral unregelmäßig, aber etwas schärfer. Etwa 2 cm unterhalb des linken Schlüsselbeines findet sich, mehr gegen die Achselhöhle zu gelegen und ebenfalls neu entstanden, eine etwa 5:5 cm große, hochrot verfärbte Hautstelle. Diese ist im Gegensatz zu den übrigen Entzündungsherden nicht erhaben, fühlt sich aber wie alle anderen, neu in Erscheinung getretenen Veränderungen heißer an, als die umgebende Haut. Subjektiv bestche an sämtlichen Stellen zuerst Juckreiz, dann Brennen.

Wegen des bereits vorgefaßten Verdachtes auf Artefakte, den das Neuauftreten der eben beschriebenen Erscheinungen noch bestärkt, wird die Kranke ins Bad geführt, um in der Zwischenzeit eine Untersuchung ihrer mitgebrachten Gegenstände auf evtl. Ätzmittel vornehmen zu können. In der Tat findet sich hierbei auch ein Fläschchen, dessen Inhalt sich nach chemischer Analyse einwandfrei als Essigsäure erwies, womit die Sch. zweifelsohne ihre Artefakte erzeugte. Trotzdem leugnet sie dies und beschwert sich weinend darüber, daß man ihr ein Fläschchen mit „Hoffmannstropfen“ fortgenommen habe, das sie stets bei sich trage, weil es ihr in der letzten Zeit öfters schlecht werde. Sie will aus Protest die Klinik verlassen — bleibt aber doch! In der Folgezeit lassen sich noch mehrmals neue, gerötete Hautstellen am rechten Oberarm und an der Brust feststellen, die jedoch nicht mehr den erhabenen Charakter aufweisen und wahrscheinlich durch Reiben hervorgerufen wurden.

Unter entsprechender Behandlung kam es zu einer vollständigen Heilung sämtlicher Erscheinungen, sodaß die Kranke in verhältnismäßig

kurzer Zeit geheilt und arbeitsfähig entlassen werden konnte. Obwohl sie bis zum letzten Tage eine Selbstbeschädigung ihrer Haut leugnete, wird sie auf das Unrechtmäßige ihrer Handlungsweise hingewiesen und der behandelnde Arzt über die Art der Krankheit aufgeklärt.

Fall 6.

Gertrud W., 14 Jahre, ledig, ohne Beruf.

Anamnese: In vorletzter Nacht sei sie mit Fieber erkrankt und habe nicht schlafen können. Morgens beim Aufstehen habe sie dann zu beiden Seiten der Mundwinkel zwei gerötete Stellen bemerkt, die über Nacht entstanden sein müßten. Gestern Nachmittag habe sie einen Schüttelfrost bekommen und habe mehrmals erbrechen müssen. Im Laufe des gestrigen Tages hätten sich die roten Flecken im Gesicht in ihrer Mitte dunkler verfärbt und auch zu nässen begonnen. Während der vergangenen Nacht seien weitere eben solche Stellen im Gesicht aufgetreten, aber teilweise wieder verschwunden.

Die Kranke macht hierbei des öfteren widersprechende Angaben besonders über die Lokalisation dieser merkwürdigen Hautveränderungen, deren erstmaliges Auftreten einmal am Mundwinkel, bald wieder an irgend einer anderen Stelle angegeben wird.

Die Menfes, die seit vorigem Jahre bestehen, seien von wechselnder Stärke, stets mit Schmerzen verbunden und meist von sechstägiger Dauer.

Allgemeinbefund: Voll entwickeltes junges Mädchen, kräftig gebaut und in gutem Ernährungszustand. Die Haut ist straff und zeigt einen guten Turgor.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Fehlen des Rachen- und Cornealreflexes.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Hautbefund: Symmetrisch zu beiden Seiten der Mundwinkel, wenige Zentimeter von diesen entfernt, findet sich eine etwa markstückgroße Stelle, die mit einem braunen Schorf bedeckt ist und eine vorhofartige, hellere Umgrenzungszone aufweist. Zwei eben solche Stellen befinden sich über beiden Jochbeinen; links, einen deutlich frischen Charakter zeigend, ein fast kreisrunder Defekt mit geröteten Rändern, in der Mitte von gelblich-blassem Aussehen und gering nässend. Über der Stirnmitte ist eine gleichbeschaffene Stelle zu verzeichnen.

Die *Diagnose* Artefakte und Hysterie läßt sich in diesem Fall wohl schon mit Sicherheit aus der Vorgeschichte stellen: aus dem direkt mysteriösen Entstehen der Hautveränderungen „über Nacht“ und den mancherlei Widersprüchen, in die sich die Kranke bei ihrer Schilderung verliert. Für die artefizielle Natur vorliegender Hautschädigung sprechen außerdem einwandfrei das ganze klinische Bild, sowie der psychische Gesamteindruck, den man bei der Untersuchung der Kranken gewinnt, die bei der typischen Hypästhesie ihrer Schleimhäute eine sichere Hysterica darstellt.



Fall 6.
Gertrud W.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Es werden gut deckende und fest sitzende Desitin salbenverbände angelegt.

Bereits in den ersten Tagen ihres Klinikaufenthaltes kann bei der Kranken ein wiederholtes Neuauftreten von gleichen Hautveränderungen beobachtet werden, die natürlich immer „von selbst“ und meist „über Nacht“ entstanden seien. Solche Stellen zeigen sich am Kinn, in der rechten Mundwinkelgegend, über dem rechten Schlüsselbein und dem obersten Teil des Brustbeines, sowie unter der linken Mamma, über dem linken Schulterblatt und in der Lendengegend. Sämtliche Hautdefekte haben ungleichmäßige, gerötete Ränder, sind scharf begrenzt und bieten stets ganz frisches Aussehen. Über die artefizielle Entstehung auch dieser Defekte dürfte wohl kein Zweifel bestehen. Sie machen den deutlichen Eindruck schwerster Hautschädigung durch Kratzen. Die Kranke wird von jetzt ab streng überwacht und es konnte auch ein weiteres Auftreten solch schwerer, mechanischer Irritationen der Haut nicht mehr festgestellt werden. Sämtliche Stellen heilen unter Desitinverbänden restlos ab. Vor ihrer Entlassung aus der Klinik wurde die Kranke noch einem genauen Verhör unterzogen und in der Tat gab sie auch zu, sich durch heftiges Kratzen mit den Fingernägeln diese Hautveränderungen selbst beigebracht zu haben. Über etwaige Motive zu diesem sinnlosen Handeln war nichts zu erfahren.

Fall 7.

Marie G., 23 jährige, ledige Stütze.

Anamnese: Erstmals vor zwei Jahren hätten sich am Unterbauch zunächst schwarze Flecken gebildet, die dann aber aufbrachen und reichlich schwarz-gelblichen Eiter entleerten. Die Eiterung soll durch viele Wochen hindurch bestanden haben. Daneben seien auch an der linken Brust, am linken und rechten Arm und am linken Unterschenkel ebensolche „geschwürige Stellen“ entstanden. Während eines vierwöchigen Krankenhausaufenthaltes bei Bettruhe, Höhen-sonnenbestrahlungen und Salbenbehandlung sei das Leiden völlig ausgeheilt. Vor zehn Monaten sei jedoch am Unterbauch wieder ein Rückfall aufgetreten und die „geschwürigen Stellen“ seien bis heute nicht mehr verheilt. Deshalb habe der Arzt, der sie bisher mit Zinksalbe behandelte, ihre Einweisung in die Klinik veranlaßt.

An subjektiven Beschwerden bestehen außer einem starken Brennen der erkrankten Hautpartien dauernd Leib- und Kopfschmerzen, nachts ein Pelzigkeitsgefühl in Armen und Beinen und außerdem Kreuzschmerzen.

Menarche mit 15 Jahren, Meneses vierwöchentlich mit 6 Tagen Dauer. Seit zirka 6 Wochen ist die Periode unregelmäßig und schmerzhaft. Die Blutungen seien immer schon ziemlich stark gewesen. Ausfluß bestehe nicht.

Allgemeinbefund: Es handelt sich um eine große, normal entwickelte Person in ausreichendem Ernährungs- und Kräftezustand.

An den inneren Organen ist kein krankhafter Befund zu erheben.

Nervensystem: Rachen- und Cornealreflex fehlen.

Psychisch macht die Kranke einen wehleidig-hysterischen Eindruck.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: Über den ganzen Unterbauch verstreut finden sich zahlreiche, teilweise narbig abgeheilte, meist aber mit braungelben Belägen bedeckte Stellen von Markstück- bis Dreimarkstückgröße. Diese einzelnen Herde sind unter das Niveau der Haut leicht eingesunken und lassen eine scharfe Begrenzung der nekrotischen Beläge erkennen. Wo diese Beläge zu Verlust gegangen sind, erscheinen zum Teil kraterförmige Einziehungen mit mißfarbenen Granulationen. Der ganze befallene Hautbezirk ist dunkelbraun pigmentiert. Diese Pigmentation ist nach oben scharfrandig begrenzt, unregelmäßig dagegen nach unten und seitlich.

Diagnose: Artefakte und Hysterie.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Unter Desitin-Schutzverbänden heilen die Hautdefekte sehr gut und rasch ab. Am zweiten Tage nach der Klinikaufnahme wurde bei der Kranken ein Fläschchen mit Kresolseifenlösung vorgefunden, das ohne Zweifel als Mittel für die Selbstbeschädigung der Haut angesehen werden mußte, was freilich von seiten der G. hartnäckig abgeleugnet wird.

Ein Neuauftreten der Hauterscheinungen wird nicht mehr beobachtet, wohl aber klagt die Kranke nach 14 Tagen über Ausfluß aus dem Genitale. Der Befund im Spekulum zeigt an der Portio, etwas links neben dem äußeren Muttermund, eine gut mandelgroße, etwas eleviert und induriert erscheinende Erosion, die bei Berührung leicht blutet. Wiederholte Abstriche auf *Spirochaeta pallida*, sowie Gonococcen haben ein negatives Ergebnis. Die Erosion der Portio geht unter Bädern mit *Argent. nitric.* gut zurück. Unter Desitin(alben)verbänden erfolgte eine völlige Abheilung der Artefakte, sodaß die Kranke nach verhältnismäßig kurzer Zeit als geheilt entlassen werden konnte. Selbstverletzungen der Haut werden dauernd geleugnet. Doch gibt noch am letzten Tage eine erneute Exploration in dieser Hinsicht einen interessanten Einblick in die Psyche der Kranken. Sie ist bei einem Arzt als Hausangestellte bedienstet und bringt ihre Magenbeschwerden, über die sie dauernd klagt, in Verbindung mit den Schmerzen solcher Kranker, die sich bei ihrem Dienstherrn einer abdominalen Operation unterziehen müssen. Von dieser Komplexvorstellung kommt die Kranke nicht mehr los und vielleicht dürften auch die Artefakte hiermit in Zusammenhang stehen.

Fall 8.

Magdalene M., 19 jährige, ledige Dienstmagd.

Anamnese: Die Kranke wurde bereits vor drei Jahren in unserer Klinik wegen seborrhöischen Kopfschmers stationär behandelt. Es fiel hierbei an, daß sie fast täglich neue Klagen vorbrachte und bei jedem therapeutisch verwendeten Mittel über eine Reizung klagte, obwohl objektiv eine solche nicht bestand, sondern vielmehr eine fortschreitende Besserung zu verzeichnen war. Sie wurde daher schon damals als hysterisch angesprochen.



Fall 7.
Marie G.

Vor zwei Jahren wurde die Kranke wegen Blinddarmentzündung operiert. Die Wundheilung erfolgte primär. Vierzehn Tage nach der Krankenhausentlassung sei jedoch die Wunde wieder aufgeplatzt und seither nicht mehr verheilt. Vom Arzt wurde mit Jodanstrich und Puder behandelt, worauf aber keine Besserung erfolgt sei. Auch rings um die Wunde seien Hauteiterungen aufgetreten.

Menarche mit 19 Jahren. Menfes stets unregelmäßig, in Abständen von 5—8 Wochen; Dauer jeweils verschieden.

Allgemeinbefund: Die Kranke ist kräftig gebaut und befindet sich in einem sehr guten Ernährungszustand. Psychisch macht sie den deutlichen Eindruck einer Hysterica.

Herz und Lunge: o. B.

Der Leib zeigt bei Palpation eine starke Abwehrspannung mit diffuser Schmerzhaftigkeit — ein Befund, der jedoch nach psychischer Ablenkung der Kranken nicht mehr erhoben werden kann.

Nervensystem: Rachenreflex nahezu fehlend, Cornealreflex nicht vorhanden.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Lokalbefund: In der rechten Unterbauchregion 8½ cm lange Appendektomienarbe, stellenweise ½ cm breit, stark gerötet. Die Umgebung der Narbe ist in gut Handflächengröße livid verfärbt und diffus mit linsengroßen Knötchen bedeckt. Im übrigen ist das Bild wegen intensiven Jodanstriches nicht zu erkennen.

Diagnose: Hysterie. Artesciell irritierte Appendektomienarbe.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Unter Desitinverbänden erfolgt gute Abheilung. Bemerkenswert zur Psyche der Kranken ist es, daß sie bei der Visite stets klagt, einen vollkommen depressiven Eindruck bietet und ein Gesicht macht, als könnte sie es vor Schmerzen nicht mehr aushalten. Kommt man jedoch einmal unverhoffterweise in den Krankensaal, so findet man sie meist mit einem ganz vergnügten Gesicht in guter Unterhaltung mit den anderen Kranken. Durch die Behandlung sind die entzündlichen Erscheinungen der Operationsnarbe und ihrer Umgebung völlig zurückgegangen; es besteht nur noch eine schmutzigbraune Verfärbung an den betreffenden Stellen. Die Kranke kann die Klinik arbeitsfähig verlassen, nachdem auch von internistischer Seite die Diagnose auf Hysterie gestellt worden war.

Fall 9.

Babette E., 19 jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Die Kranke litt vom ersten bis zum sechsten Schuljahre angeblich an einem Hautauschlag beider Füße. Vor vier Jahren habe sie sich am rechten Fuß gestoßen und daraufhin sei wieder eine Entzündung des ganzen Fußes eingetreten. Nach Bericht des Arztes bekam die Kranke im vergangenen Jahr, im Anschluß an eine geringfügige Verletzung Geschwüre an beiden Händen. Diese heilten auf Salben und feuchte

Verbände wieder ab, doch traten ständig neue Geschwüre auf. Die Haut rötete sich dabei zuerst in einem gewissen, umschriebenen Bezirk, es bildeten sich Blasen und auch einzelne weißliche Stellen. Diese letzteren führten dann zu Nekrosen, während die übrigen erkrankten Hautstellen rascher abheilten. Vor etwa vier Monaten trat nach einer kleinen Brandwunde am rechten Schienbein der gleiche Prozeß wieder auf. Kaum ist eine Stelle abgeheilt, so kommt meist „über Nacht“ an einem anderen Ort eine neue Nekrose.

Die Menfes traten erstmalig mit dreizehn Jahren auf, sistierten dann aber drei Jahre. Jetzt sind sie regelmäßig und ohne Schmerzen.

Allgemeinbefund: Guter Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex und Cornealreflex fehlen.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Hautbefund: Über dem rechten Fußrücken befindet sich eine etwa fünfmarkstückgroße Narbe von unregelmäßiger Begrenzung. Am rechten Unterschenkel, dicht über dem Fußgelenk, zeigt sich ein scharf umschriebenes 5 cm breites und 7 cm langes Ulcus, welches teilweise mit gelben Schorfen bedeckt ist, zwischen denen epithelisierte Inseln liegen. Desweiteren finden sich am rechten Unterschenkel in Abheilung begriffene, verschieden große, oberflächlich ulcerierte Efflorescenzen, die zum Teil braungelbe Krusten tragen, zum Teil bereits frisches, rosafarbenes Narbengewebe aufweisen. Eben solche narbig abgeheilte Stellen sind an der Wade, wie an beiden Knöcheln des rechten Unterschenkels zu sehen.

Diagnose: Artefakte.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Unter Desitin-Steifgazeverbänden erfolgt glatte Abheilung der Ulcerationen. Nach Abnahme der Steifgaze und Freilassen der nahezu abgeheilten Stellen konnte ein Neuaufreten von Bläschen beobachtet werden, die wahrscheinlich durch Reiben der Haut erzeugt wurden und unter Moronalkompressen wieder abheilten. Die Kranke wird geheilt entlassen. Für die Diagnose sprechen die glatte Abheilung unter Steifgazeverbänden und das klinische Bild.

Fall 10.

Barbara P., 18 jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Die Kranke leidet häufig an Erbrechen mit Kopfschmerzen. Vor fünf Monaten habe sie am rechten Unterarm eine „Flechte“ gehabt. Vor fünf Wochen sei der gleiche Unterarm stärker geschwollen und es seien angeblich rote Flecken an der Haut aufgetreten, die sich dann in eiterige Stellen verwandelt hätten. Die gleiche Erkrankung habe dann auch die Brust befallen.

Die ersten Menfes seien erst vor kurzem eingetreten.

Allgemeinbefund: Die Kranke ist körperlich und psychisch zurückgeblieben von infantil-ptotischem Typ.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex und Cornealreflex fehlen.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: Die ganze linke Brust ist mit dicken, eitrigen Krusten bedeckt, zum Teil kann man stellenweise, wo die Krusten abgehoben sind, tiefere Hautdefekte erkennen. An der Streckseite des rechten Unterarmes im unteren Drittel ist die Haut teilweise mit Schorfen, teilweise mit eitrigen Krusten bedeckt. Das Ganze ist scharfkantig abgegrenzt und läßt auf den ersten Blick eine artefizielle Erzeugung erkennen.

Diagnose: Artefakte der linken Brust und des rechten Unterarmes bei Hysterie.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Unter einfachen Desitinverbänden zeigen die Stellen anfänglich nur eine geringe Heilungstendenz. Der Übergang zu Steifgazeverbänden, die von der Kranken immer als lästig und reibend empfunden werden, bringt jedoch eine rasch fortschreitende Besserung. Von Magenbeschwerden mit Erbrechen wird die Kranke durch eine Magenausheberung sofort befreit.

Mit einem Desitin-Steifgazeverband am rechten Unterarm, wo noch zwei kleine, erbsengroße Ulcerationen bestehen, kann die Kranke als wesentlich gebessert entlassen werden, da alle übrigen Stellen abgeheilt sind.

Aus der Art der Veränderungen und dem prompten Abheilen unter Okklusivverbänden ließ sich die Diagnose Artefakte stellen.

Fall 11.

Johanna M., 34-jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Früher häufig starke Beschwerden infolge eines Ulcus ventriculi. Deshalb vor sieben Jahren Operation. Noch im gleichen Jahre operiert wegen Retroflexio uteri.

Auch jetzt bestehen noch häufig Magenbeschwerden besonders nach dem Essen, mit Aufstoßen verbunden, die monatelang anhalten und dann wieder monatelang aussetzen sollen. Gleichzeitig bzw. kurz vor Auftreten der Magenschmerzen sollen braune Flecken im Gesicht erscheinen.

Seit sechs Jahren hat die Kranke am Leib eine Hautveränderung, die mit roten Flecken und Blasenbildung beginnt, oft rasch abheilt, aber bald wieder von neuem auftritt. Vom Arzt wurde mit Salbe behandelt.

Menfes immer regelmäßig; mit 17 Jahren erster Partus.

Allgemeinbefund: Kleine, gut ernährte Person mit gut entwickeltem Fettpolster.

Innere Organe ohne krankhaften Befund.

Nervensystem in Ordnung.

Psychisch macht die Kranke den Eindruck einer Hysterica.

Wa R: — — — M Tr R: —

Hautbefund: Über beiden Brusthälften finden sich rote Flecken von etwa Hühnereigröße, die am Rand stark pigmentiert erscheinen. Auch auf dem Leib sind ähnliche Flecken mit starker Pigmentation zu sehen. Ein großer, geröteter Herd mit Blasenbildung und Epitheldefekt verläuft quer über den Oberleib. Um den Nabel herum ist eine narbige, ebenfalls gerötete Hautveränderung festzustellen. In der Medianlinie zieht vom Proc. xiph. bis fast zum Nabel eine etwas hypertrophische, reaktionslose Narbe (Operation!).

Ebenso findet sich eine querverlaufende Operationsnarbe über der Symphyse in der Unterbauchfalte (vgl. Anamnese!).

Auf dem linken Vorderarm sind mehrere markstückgroße, weiße Herde mit braunem Rand und vermehrter Follikelzeichnung zu sehen.

Im Gesicht, besonders an der Stirnhaargrenze und Stirne finden sich braune Pigmentationen.

Diagnose: Vermutlich artefizielle Veränderungen.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die von Epidermis freien Stellen werden mit Moronalkompressen 1%ig behandelt, im übrigen Desitin-Jalbenverbände. Außerdem wird versucht die Kranke psychisch zu beeinflussen. Jeden dritten Tag wird sie elektrisiert. Es treten rasch Besserung und fortschreitende Heilung ein. Ein Neuauftreten von Erscheinungen konnte bei genauer Beobachtung der Kranken nicht mehr festgestellt werden. Sie wird geheilt entlassen. Die roten Flecken sind überall abgeblaßt und die der Epidermis beraubten Bezirke epithelisiert.

Fall 12.

Babette St., 16 jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Nach dem Bericht des behandelnden Arztes hatte sich die Kranke vor vier Monaten geringfügig an der Nase verletzt. Daran schloß sich nach etwa 14 Tagen ein erysipeloïder Ausschlag mit bullösen Eruptionen an, der sich unter Abheilung der zuerst befallenen Stellen langsam über das Gesicht und den Hals ausbreitete und schließlich auch auf die Brust übergriß, wo er heute noch besteht. Trotz dauernder Anwendung von Salben (Idthyol), Umschlägen und Spülungen gelang es nicht dem Fortschreiten des Krankheitsprozesses Einhalt zu gebieten.

Allgemeinbefund: Dem Alter entsprechend kräftige Kranke.

Innere Organe: o. B.

Nerven[system: Rachenreflex und Cornealreflex fehlen. Dermographismus negativ.

Wa R: — — — M Tr R: —

Hautbefund: Die Haut der Brust, über beiden Claviceln beginnend und über die Mammæ reichend, ist beträchtlich gerötet, stellenweise mit dicken, gelbbraunen Krusten bedeckt und weist an anderen Stellen wieder Blasenbildung von KirschgröÙe auf. Die Herde zeigen teils runde, teils ziemlich scharf begrenzte viereckige Form. Am Hals und im Gesicht, dem Sitz abgeheilter Herde, besteht leichte Hyperpigmentation bzw. Pigmentverschiebung.



*Fall 12.
Babette St.*



*Fall 13.
Frieda Pf.*

Diagnose: Artefakte.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Unter Desitinverbänden heilten die Hautveränderungen in verhältnismäßig kurzer Zeit glatt ab, sodaß die Kranke völlig geheilt entlassen werden konnte.

Die Ursache der Artefakte konnte nicht festgestellt werden: doch ergibt sich die Diagnose einwandfrei aus dem klinischen Bild, wie auch aus dem raschen Heilverlauf.

Fall 13.

Frieda Pf., 19jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Vor ungefähr einem Jahr seien im Anschluß an einem Hummeltich am ganzen rechten Arm Geschwüre aufgetreten, die unter starker Narbenbildung abheilten. Seither jedoch sei der Arm immer wieder an neuen Stellen von solch geschwürigen Hautveränderungen befallen worden. Die Kranke wurde deshalb von ihrem Arzt zur Klärung der Diagnose unserem Ambulatorium zugeleitet.

Spezieller Befund: Die Streckseite des ganzen rechten Armes ist bedeckt von streifenförmig angeordneten und über das Hautniveau erhabenen, keloidartigen Narben. Am linken Ellenbogen, ebenfalls mehr an der Streckseite lokalisiert, befindet sich eine fünfmarkstückgroße Ulceration, mit einem derben, nekrotischen Schorf überkleidet.

Im Allgemeinen macht die Kranke den Eindruck einer Hysterica, was durch den stark herabgesetzten Würgreglex bestätigt wird.

Hieraus, sowie aus der Anamnese und dem ganzen klinischen Bild ergibt sich die *Diagnose:* Hysterie mit Artefakten.

Der behandelnde Arzt wird über die Hautveränderungen aufgeklärt. Es werden Desitinverbände unter Steifgaze empfohlen.

Die Ursache der Artefakte ließ sich nicht ermitteln.

Fall 14.

Lina G., 21 jährige, ledige Arbeiterin.

Anamnese: Bei der Kranken bestehen seit kurzer Zeit Hautverletzungen im Gesicht, die von ihr als beruflich erworben hingestellt werden, da sie bei ihrer Arbeit in der Fabrik ständig mit Säuren zu tun habe. Sie wird auch deshalb von ihrem behandelnden Arzt zur Feststellung einer Berufserkrankung unserer Poliklinik überwiesen.

Hautbefund: An beiden Wangen, scharf von der übrigen, gesunden Haut sich abhebend, sind streifenförmige Hautdefekte zu sehen, die entzündlich gerötete Ränder aufweisen und mit derben, dunklen Schorfen bedeckt sind.

Schon dieser Befund allein genügt, um den Verdacht auf artefizielle Hautveränderungen rege werden zu lassen. Dazu bietet die Kranke durch ein theatralisch-wehleidiges Wesen psychisch auch noch eindeutig das Bild einer Hysterie, eine Annahme, die durch das Fehlen des Rachen- und Cornealreflexes eine gewisse Bestätigung findet.

Diagnose: Artefakte bei Hysterie.

Die Annahme einer Berufskrankheit muß demnach unbedingt abgelehnt werden, zumal noch eine Nachforschung in dem fraglichen Fabrikbetrieb ergeben hat, daß durch weitgehendste Schutzvorrichtungen eine Verätzung des Personals durch Säuren so gut wie unmöglich ist.

Nach ungefähr einem halben Jahr wird die Kranke von der Medizinischen Universitätsklinik, Erlangen, wo sie wegen Gastritis in Behandlung steht, mit erneuten Hautverätzungen im Gesicht unserem Ambulatorium überwiesen. Bemerkenswert ist, daß G. zur Zeit nicht in der Fabrik arbeitet, also nicht mit Säuren in Berührung kommt und diesmal die Hautveränderungen als „selbst entstanden“ bezeichnet. Der spezielle Hautbefund im Gesicht ist der gleiche, wie er das letzte Mal erhoben wurde und oben beschrieben ist. Über die Art der Erkrankung wird der Medizinischen Klinik ein genauer Bericht zugeleitet und eine Behandlung mit Desitin[alben-verbänden empfohlen.

In weiteren poliklinischen Sprechstunden, zu denen G. von uns bestellt wird, kann ein Auftreten von neuen streifenförmigen, mit Ätzhorfen bedeckten Herden am Kinn, am Hals und der rechten Schläfenseite beobachtet werden. Die auslösende Ursache dieser Artefakte läßt sich nicht ermitteln; G. bleibt nach einer scharfen Zurechtweisung wegen ihrer Handlungsweise unserer poliklinischen Sprechstunde fern.

Mehrere Monate später konnte durch den behandelnden Arzt in Erfahrung gebracht werden, daß bei der G. dieselben artefiziellen Hautveränderungen auch am ganzen linken Arm auftraten und daß sie wiederholt typisch hysterische Anfälle bekommen hatte.

Eine erbliche Belastung der G. liegt zweifellos vor; denn der Vater ist ein ausgesprochener Psychopath und befand sich deshalb schon längere Zeit in der Heil- und Pflegeanstalt, Erlangen.

Fall 15.

Margarete G., 23 jährige, ledige Dienstmagd.

Anamnese: Die Kranke wurde als außereheliches Kind geboren und bei fremden Leuten erzogen. Die Pflegemutter, mit der die Kranke sich sehr gut verstand, starb vor sechs Jahren. Der Pflegevater, bei dem sie bis zuletzt war, soll ein äußerst jähzorniger, grober Mensch sein, der sie immer sehr ansdrie und auch oft schlug.

Die Kranke war im allgemeinen gesund. Vor einem Jahre erkrankte sie an einer rechtsseitigen Hüftgelenkentzündung, die durch ärztliche Behandlung geheilt wurde.

Vor drei Jahren trat im Anschluß an Streuung von Kunstdünger (Kalkstickstoff) eine kleine entzündliche Stelle am linken Handrücken auf. Diese heilte zwar kurz darauf zu, brach aber in der folgenden Zeit immer gelegentlich wieder einmal auf, obwohl eine Berührung mit Kunstdünger nicht mehr erfolgte. Vor sechs Monaten traten auch an beiden Knien und am rechten Sprunggelenk ebensolche eiterig entzündliche Stellen auf und zwei Monate später wurden in gleicher Weise beide Kniekehlen und



Fall 14.

Lina G.

Ellenbeugen, sowie der Hals befallen. Alle Stellen eiterten stark, heilten aber teilweise wieder ab. An den beiden Ellenbeugen und dem rechten Sprunggelenk wollte jedoch keine Heilung eintreten. Dazu stellte sich das alte Hüftgelenkleiden wieder ein und die Kranke wurde deshalb vom Arzt zunächst in die hiesige Chirurgische Universitätsklinik eingewiesen. Dort konnte an beiden Hüftgelenken ein krankhafter Befund nicht erhoben werden. Sie stand im Verdacht der Temperaturfälschung und wurde wegen weiteren Verdachtes auf arteficielle Hauterkrankung unserer Klinik überwiesen.

Menarche mit 17 Jahren. Die Periode ist immer unregelmäßig, setzt oft ein halbes bis dreiviertel Jahr aus und ist schmerzhaft. Kein Abortus. Kein Partus. Kein Fluor.

Allgemeinbefund: Kräftige, gesund aussehende Kranke in gutem Ernährungszustande. Sie spricht mit halblauter, leidender Stimme und hält das rechte Bein beim Gehen steif.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Austrittsstelle des Nervus occipitalis druckempfindlich. Würgereflex fehlt! Sonst normaler Befund.

Wa R: - - - M Tr R: -

Hautbefund: Am Hals, auf der ganzen Vorderseite, befinden sich lange, keloidartig verdickte, rötlich-blaue Narben, horizontal verlaufend mit vertikalen Ausläufern. An beiden Kniegelenken, kreisförmig um die Patella ziehend, ebenso solche Narben und an einzelnen Stellen trockene Krusten. In beiden Knie- und Ellenbeugen dicke, rötliche Narben, die kreuz und quer ziehen. Am linken Handrücken sind die gleichen narbigen Veränderungen mit stärkeren Krustenauflagerungen nachweisbar. Rechte Hand ist frei.

Auf dem linken Fußrücken finden sich zwei Ulcerationen von Markstüßgröße.

Diagnose: Arteficielle Dermatitis.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Byrolinsalbenverbände. An den keloidartigen Veränderungen des Halses Anwendung von Pepsinsalbe. Die Kranke muß nach 5 Tagen wegen Erkrankung ihres Vaters beurlaubt werden und verläßt die Klinik. Sie teilt kurz darauf mit, daß sie wegen häuslicher Verhältnisse nicht mehr zurückkommen könne. Der behandelnde Arzt wird über die Art des Leidens aufgeklärt.

Fall 16.

Rosa R., 17 jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Vater im Kriege gefallen, Mutter nervenleidend. Ein 27 jähriger Bruder bekommt öfters, wenn er sich aufregt, Anfälle, die dauern bis zu zwei Stunden und er schlägt dabei mit Händen und Füßen um sich. Vor zehn Wochen schüttete sich die Kranke beim Waschen

heißes Wasser auf den rechten Fußrücken. Es entstand eine große Brandblase, die vom Arzt mit Salbe behandelt wurde und bald wieder abheilte. Vor 14 Tagen sei nun ganz plötzlich das rechte Bein an der Innenseite des Knies „aufgebrochen“ und seitdem seien fortschreitend gleiche offene Stellen an der Haut des rechten Oberschenkels und des ganzen linken Beines aufgetreten.

Die Menarche trat mit 14 Jahren ein. Die Menfes seien sehr unregelmäßig mit starken Blutungen, oft von achttägiger Dauer.

Allgemeinbefund: Die Kranke ist kräftig gebaut und zeigt einen guten Ernährungszustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Würgeresflex schwer unlösbar; Dermographismus ruber, sonst normaler Befund.

Wa R: — — — M Tr R: —

Spezieller Befund: An den Streckseiten der unteren Extremitäten befinden sich vielgestaltige Ulcerationen, zum Teil in Tropfenform, die mit gelben Ätzschorfen bedeckt sind. Am rechten Fußrücken sind zwei Narben von Markstückgröße festzustellen. Das Abdomen unterhalb des Nabels zeigt Kratzeffekte.

Diagnose: Artefakte.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die artefiziellen Ulcera heilen unter Desitinverbänden glatt ab. Die an sich gut verheilenden Wunden zeigen immer wieder neue Kratzeffekte und auf ernstliche Ermahnungen hat die Kranke stets nur ein dummes, stupides Lächeln. Sie wird völlig geheilt entlassen.

Die Ursache der Artefakte ließ sich nicht ermitteln. Die Diagnose ergibt sich aus dem klinischen Bild.

Fall 17.

Margarete L., 27 jährige, ledige Dienstmagd.

Anamnese: Vor 1½ Jahren erlitt die Kranke beim Heben eines festgefahrenen Wagens durch Stoß gegen das Wagenrad eine, wie sie selbst angibt, anfänglich nur geringfügige Schürfverletzung am rechten Unterschenkel. Nach einigen Tagen traten an der Stelle Eiterung und eine blau-rote Verfärbung auf. Durch ärztliche Behandlung mit Umschlägen sei keine Besserung erfolgt und sie wurde daher in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort sei sie „in Narkose“ an dem Bein „operiert“ worden, worüber jedoch näheres nicht zu erfahren ist. Nach drei Wochen wurde sie dann als arbeitsunfähig entlassen, da die eiternde Stelle am Unterschenkel immer noch nicht ganz verheilt war. Erst in ärztlicher Nachbehandlung mit Salben sei eine völlige Heilung eingetreten, die aber nicht von langer Dauer gewesen sei. Nach kurzer Zeit sei die Stelle wieder „aufgebrochen“ und in der Umgebung hätten sich ständig kleine Eiter-



Fall 17.
Margarete L.

bläschen gebildet. Seither habe sich dieser Zustand trotz ärztlicher Behandlung mit Salbenverbänden und Höhenjonnenbestrahlungen nicht mehr geändert. Nur bemerkte die Kranke eine eigentümliche Abhängigkeit ihres Leidens von ihrer Regel. Mit Eintritt derselben trete nämlich stets eine Besserung auf, allerdings ohne dauernden Bestand. Augenblicklich leide sie an stärkeren Unregelmäßigkeiten ihrer Menfes und habe nun beobachtet, daß zu dem Zeitpunkt, an dem die Regel normalerweise hätte eintreten müssen, das erkrankte Bein sehr stark angeschwollen sei.

Vor drei Wochen erfolgte durch die hiesige Chirurgische Universitätsklinik eine Unfallbegutachtung der Kranken, auf Grund deren sie zu einem Heilverfahren in unsere Klinik eingewiesen wurde.

Menarche mit 19 Jahren. Menfes alle 12—13 Wochen von 3—4 tägiger Dauer. In der letzten Zeit sei die Periode unregelmäßig und mit starken Schmerzen verbunden. Kein Partus, kein Abortus.

Allgemeinbefund: etwas kleine, aber sonst kräftige Person in gutem Ernährungszustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex herabgesetzt, Cornealreflex fehlt!

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Befund: Im unteren Drittel des rechten Unterschenkels sieht man eine annähernd quadratische, 10 cm lange und 13 cm breite entzündliche Hautveränderung, innerhalb der sich ein rundliches Geschwür befindet. Dieses zeigt unregelmäßige, aber scharf begrenzte Ränder. Der Geschwürsgrund ist frei von Sekret. Etwas median von dieser Ulceration ist eine dicke Krustenauflagerung zu sehen, die der Stelle des beim Unfall erlittenen Stoßes entsprechen soll. Die ganze Hautveränderung läßt einen scharf abgelesenen Übergang vom kranken ins gesunde Gewebe erkennen, der linienförmig, direkt wie mit Bleistift und Linial gezogen erscheint.

Innerhalb der erkrankten Hautpartie sieht man noch hellere, narbige Stellen, die alle ehemaligen Ulcera entsprechen. Etwas oberhalb, sowie auch lateral vom Krankheitsherd gelegen, sind ebenfalls noch teils braune, teils rötlich verfärbte Hautpartien, die nach Angabe alle schon offen gewesen sein sollen.

Unterhalb der rechten Patella befindet sich eine 5 : 5 cm große, narbige Fläche, die in keiner Weise mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht werden kann.

Das linke Knie zeigt eine keloidartige Operationsnarbe, die von einer „operativen Entfernung von Steinen“ herrühren soll, welche sich die Kranke bei einem Sturz „eingeschlagen“ haben will. Neben der eigentlichen Operationsnarbe sieht man aber noch eine weitere, starke Keloidbildung, von deren Zustandekommen und Entstehungsursache die Kranke nichts weiß.

Diagnose: Das merkwürdige Krankheitsbild, sowie auch die etwas eigenartige Anamnese lassen den Verdacht auf eine artefizielle Hautschädigung als sehr naheliegend erscheinen.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Das große Ulcus wurde mit Desitin salbe unter Steifgaze schutzverbänden behandelt und zeigte in kurzer Zeit eine vollständige Abheilung. Wegen einer stärkeren Maceration der Haut in der Umgebung mußten Moronalkompressen angewendet werden, doch war hier der Heilerfolg nur ein langsamer. Verschiedentlich konnte in dem erkrankten Bezirk eine frische Blutung festgestellt werden, die eindeutig auf irgendwelche Manipulationen der Kranken zurückgeführt werden mußte. Sie befolgte auch in keiner Weise die Anordnungen des Arztes und trotz angeordneter Bettruhe wurde sie des öfteren im Krankensaal herum springend angetroffen. Es wurde deshalb bei strengster Bettruhe wieder zu Desitin-Steifgazeverbänden übergegangen, unter denen auch eine endgültige, gute Heilung eintrat, sodaß eine baldige Entlassung der wieder arbeitsfähigen Kranken erfolgen konnte. Eine Abhängigkeit der Erkrankung von den Menfes war natürlich nicht zu beobachten, wohl aber wurde die Kranke mehrfacher Temperaturfälschungen überführt. Nach ihrer Entlassung wurde von einer Saalkranken berichtet, daß sie die L. mehrmals beobachtet habe, wie sie mit einer „Scheuerbürste“ das Geschwür „bearbeitet“ hätte und auf Befragen, den Juckreiz als Grund zu diesem sinnlosen Handeln angab. Mit dieser Beobachtung dürfte wohl auch dieser Fall als Artefakt einwandfrei geklärt sein.

Fall 18.

Katharina P., 22 Jahre, ledig, ohne Beruf.

Anamnese: Vor einem Jahr traten bei der Kranken aus unbekannter Ursache drei etwa stechnadelkopfgroße, mit Eiter gefüllte Bläschen an der Streckseite des rechten Unterschenkels auf. Aus diesen Bläschen hätte sich bald ein Geschwür gebildet, das trotz ärztlicher Behandlung mit Salben erst nach 4 Monaten abgeheilt sei. Vor 5 Wochen hätten sich nun am linken Unterschenkel unter der Haut wieder solche Bläschen gebildet, die nach Aufbrechen das jetzt bestehende Geschwür verursacht hätten. Die Behandlung blieb bisher erfolglos und die Kranke suchte deshalb auf Anraten ihres Arztes unsere Klinik auf.

Menarche mit 14 Jahren; Menfes nicht immer regelmäßig, von dreitägiger Dauer, ohne besondere Beschwerden. In letzter Zeit mehrmals „Herzanfälle“.

Allgemeinbefund: kräftig gebautes, junges Mädchen in gutem Ernährungszustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex und Cornealreflex fehlen.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Hautbefund: An der Streckseite des linken Unterschenkels, im mittleren Drittel, befindet sich eine etwa markstückgroße Ulceration, scharf begrenzt, mit speckig belegtem Geschwürsgrund und leicht erhabenen Rändern, die nicht unterminiert sind. Die Umgebung weist eine entzünd-

liche Rötung auf, die sich namentlich nach abwärts fortsetzt. Dort sind, wenige Zentimeter entfernt, eine pfennigstückgroße, krustöse Stelle, sowie einige kleinere, frisch erodierte Stellen zu sehen. Lateral davon gelegen, befinden sich ebenfalls vier entzündlich veränderte Hautstellen, von Linjen- bis Markstückgröße. Aus einer derselben, die mit einer braunen Kruste bedeckt ist, quillt auf Druck Eiter, während zwei weitere einen mehr frisch erodierten Charakter aufweisen, eine kreisrunde Form haben und nässen. Die vierte, etwa markstückgroße Hautveränderung weist an ihrer Oberfläche leichte Schuppung auf und zeigt eine derbe, knotige Beschaffenheit.

Am rechten Handgelenk sind auch einige kleinere, krustös veränderte, entzündliche Hautstellen vorhanden, die jedoch in Abheilung begriffen sind. Daneben findet sich eine kleine, frisch erodierte Hautstelle.

Diagnose: Beim ersten Eindruck glaubt man, chronische Pyodermien vor sich zu haben. Wenn man aber das ganze Krankheitsbild etwas eingehender überblickt und besonders die scharf begrenzten, frischen Erosionen in Betracht zieht, so kann man sich des Gedankens an eine artefizielle Hautschädigung nicht erwehren.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die Stellen am rechten Handgelenk heilen unter Alkoholverbänden und Rivanolzinkpaste völlig ab. Am linken Unterschenkel kommen anfänglich Moronalkompressen zur Anwendung, die aber angeblich brennen und daher durch Borwasserkompressen ersetzt werden. Hierunter erfolgte gute Reinigung der Geschwüre. Durch weitere Behandlung mit Schwefelpaste erfolgte auch hier glatte Heilung, bis auf die große Ulceration in Unterschenkelmitte, die eine etwas langsame, aber doch fortschreitend gute Heilungstendenz zeigte. Ein sicherer Anhaltspunkt für Artefakte konnte nicht gefunden werden. Trotzdem aber wurde an die Kranke eine dringliche Ermahnung in dieser Hinsicht gerichtet, worauf sie jedoch nur mit einem merkwürdigen Lächeln, das unbedingt hysterisch anmutete, antwortete. Da eine wesentliche Besserung eingetreten war, konnte eine weitere ambulante Behandlung erfolgen. Die immer noch nicht vernarbte, größere Ulceration wurde mit feuchter Kammer behandelt. Im Verlauf der weiteren Behandlung konnte nun mit Sicherheit festgestellt werden, daß die Kranke zu Hause die Verbände abnahm, um ihr Geschwür wahrscheinlich mit den Fingernägeln zu bearbeiten. Es fanden sich nämlich wiederholt frische Blutungen am Ulcus und eines Tages in der Umgebung einwandfreie neue, wohl durch Kratzen entstandene Exkoriationen. Deshalb wurden nun Steißgazeverbände angelegt, unter denen dann eine glatte Abheilung erzielt werden konnte. Damit dürfte wohl der artefizielle Charakter der Erscheinungen seine Bestätigung gefunden haben.

Fall 19.

Margarete G., 14jährige, ledige Verkäuferin.

Anamnese: Vor etwa fünf Monaten war die Kranke mit Umfüllen von pulverisierter Soda beschäftigt. Sie sei dabei plötzlich ausgeglitten und hingestürzt, was eine starke Staubwirkung der Soda zur Folge gehabt habe.

Dieser Staub habe sich am linken Vorderarm niedergeschlagen und starkes Brennen verursacht, weshalb die Kranke kaltes Wasser darüber laufen ließ, was jedoch die Schmerzen noch vermehrte. In den nächsten Tagen seien am linken Unterarm mehrere verschieden große Blasen aufgetreten und auch am rechten Unterarm hätten sich solche gebildet. Diese Blasen hätten sich weiter in tiefe Geschwüre umgewandelt. Unter ärztlicher Behandlung mit Borwasserumschlägen und Salben seien die Stellen gut abgeheilt, bis auf eine Stelle am rechten Handgelenk, die auch jetzt noch offen sei. Zeitweise seien aber immer wieder kleinere Bläschen aufgetreten, die vom Arzt aufgezwickt worden seien. Vor kurzem hätten sich nun am linken Unterarm wieder größere Blasen mit Geschwüren gebildet, was den Arzt veranlaßt habe, die Kranke in unsere Klinik einzuweisen.

Menarche mit 12 Jahren, Menfes regelmäßig, alle vier Wochen mit 3—4 tägiger Dauer und ohne Beschwerden.

Allgemeinbefund: Voll entwickeltes, mittelgroßes, junges Mädchen in gutem Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex fehlt, Cornealreflex herabgesetzt.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: An der Lateral- wie Streckseite des linken Unterarmes finden sich pfennigstückgroße, gerötete, narbige Hautpartien, die eine rundliche Form haben und scharf abgegrenzt sind. Gleiche Hautveränderungen von Linien- bis Pfennigstückgröße sind am linken Handgelenk, Ellenbogengelenk und im unteren Drittel des linken Oberarmes, desgleichen auch an der rechten Unterarmstreckseite in diffuser Ausfaat vorhanden. An der Streckseite des rechten Handgelenkes besteht ein pfennigstückgroßes, scharf begrenztes und kreisrundes Ulcus mit leicht krustig belegtem Grund und entzündlich geröteter Umgebung.

Abweichend von den bisher beschriebenen Erscheinungen sind an der Beugeseite des linken Unterarmes entzündliche Hautveränderungen vorhanden, die in streifenförmiger Anordnung quer über den linken Unterarm verlaufen und das Bild typischer Schürfwunden bieten. Sie erwecken hinsichtlich Verlauf und Aussehen den sicheren Eindruck, durch die Fingernägel der rechten Hand erzeugt worden zu sein.

Diagnose: Schon aus den zweifelhaften Angaben der Kranken über die Entstehung der Hautveränderungen, im besonderen aber aus dem charakteristischen klinischen Bild ist die Diagnose mit großer Wahrscheinlichkeit auf Hysterie und Artefakte zu stellen.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die Diagnose bestätigt sich ex therapia, d. h. durch ein glattes Abheilen sämtlicher Erscheinungen unter Steifgaze-Salbenverbänden. Neuauftreten von gleichen Stellen wird nicht beobachtet, doch klagt die Kranke eines Tages über starke „Fliegenstiche“ an der rechten Wade. Dort finden sich zwei linsengroße, gerötete,

nässende Stellen von rundlicher Form, die mehrere kleinste Stichöffnungen aufweisen. Das ganze Bild spricht absolut in keiner Weise für einen Insektenstich, sondern macht vielmehr den Eindruck, als ob es durch Stacheln mit einer Nadel erzeugt worden sei. Auf eine entsprechende, scharfe Zurechtweisung wegen ihres törichten Handelns findet die Kranke keine Erwiderung. Sie kann geheilt, arbeitsfähig entlassen werden. Am letzten Tage ihres Klinikaufenthaltes wird sie eines Diebstahles von 5 Mark überführt. Sie hatte das Geld einer Saalkranken entwendet und hielt es auf dem Klosett im Ofen verborgen.

Fall 20.

Emilie Sch., 24 jähriges, lediges Dienstmädchen.

Anamnese: Schon vor längerer Zeit seien am rechten Unterarm auf unerklärliche Weise „von selbst“ Geschwüre aufgetreten, die trotz mehrfacher ärztlicher Behandlung nie zugeheilt seien, weswegen auch ärztlicherseits eine Einweisung in unsere Klinik erfolgte.

Menarche mit 20 Jahren. Meneses stets unregelmäßig in Abständen von 14 Tagen bis zu acht Wochen. Immer starke Blutungen, die meist 6 Tage dauern und anfänglich mit heftigen Schmerzen verbunden sind. Kein Abortus. Mit 21 Jahren erster Partus und Operation eines hierbei entstandenen Uterusprolapses.

Allgemeinbefund: Die Kranke zeigt einen guten Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachen- und Cornealreflex fehlen.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: Die Streck- und Beugeseite des rechten Unterarmes weist zahlreiche, verschieden große, geschwürige Hautdefekte auf. Diese Stellen zeigen teils Neigung zu konfluieren, teils erscheinen sie als kleine, tropfenförmige Spritzer, die sogar das charakteristische Abfließen aufgespritzter Flüssigkeitstropfen erkennen lassen. Sämtliche Veränderungen weisen eine stark entzündlich gerötete Umgebung auf, heben sich aber von dieser scharf begrenzt ab. Neben diesen Erscheinungen sieht man zahlreiche Narben von verschiedener Größe.

Diagnose: Bei diesem typischen klinischen Bild und der ganz unklaren Entstehung dürfte wohl kein Zweifel bestehen, daß Artefakte bei einer hysterischen Kranken vorliegen.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Es werden Desitinlindenverbände unter Steifgazeverbänden angelegt, unter denen in kurzer Zeit eine völlige Abheilung erzielt wird.

Bald nach ihrer Entlassung aus der Klinik sucht die Kranke wieder unsere Sprechstunde auf, wegen eines neuerlichen Geschwürs am rechten

Unterarm. In ambulanter Behandlung wird jedoch wenig Besserung erreicht. Wenige Monate später erfolgt eine erneute Klinikaufnahme, da ein frisches Ulcus am rechten Unterschenkel aufgetreten ist, angeblich dadurch entstanden, daß die Kranke bei der Arbeit mit dem Bein gegen einen Pflug gestoßen sei.

Befund: Am rechten Unterschenkel, in der Mitte der Streckseite ist eine etwa fünfmarkstückgroße, mit einem roten Hof umgebene Ulceration zu sehen. Der Grund ist schmierig, graugelb verfärbt, die Randpartien sind krustös belegt. Auffallend ist wieder die scharf umschriebene Begrenzung des Geschwürs.

Es besteht daher kein Zweifel, daß wieder ein Artefakt vorliegt.

Die Heilung unter Desitin-Steifgazeverbänden geht diesmal nur langsam vorwärts. Es wird nach bereits eingetretener Besserung wiederholt an der ulcerierten Stelle neues, leichtes Bluten und Nässen festgestellt, ein Befund, der nicht als der Norm entsprechend angesehen werden konnte. Es mußte daher angenommen werden, daß die Kranke wieder Manipulationen irgendwelcher Art vorgenommen hatte. Sie hielt sich auch nicht im geringsten an ärztliche Anordnungen und lief trotz verordneter strenger Bettruhe den ganzen Tag herum. Es erfolgte daher bei einem immerhin wesentlich gebesserten Zustand die Entlassung als arbeitsfähig. Der behandelnde Arzt und die Kasse erhielten einen genauen Bericht über das Leiden der Kranken und deren Verhalten.

Drei Jahre später wurde die Kranke wieder zu stationärer Behandlung in unsere Klinik aufgenommen. Vor acht Tagen war sie beim Rodeln mit einem anderen Schlitten zusammengestoßen. Dabei habe sie sich wieder an ihrem ehemals erkrankten rechten Bein verletzt. Aber auch am linken Unterschenkel habe sie sich bei dem Anprall eine Schürfwunde zugezogen. Diese Stelle sei stark angeschwollen, habe sich blau verfärbt und sei aufgebrochen. Ärztlicherseits wurden Salben angewendet, auf die jedoch eine Verschlechterung eingetreten sei. Deshalb erfolgte vom Arzt die Einweisung in die Klinik.

Befund: Am linken Unterschenkel, in der Mitte der Streckseite, findet sich ein scharf umrandetes Ulcus in Ausdehnung von 2,8:2,5 cm. Die Umgebung ist entzündlich gerötet, der Geschwürsgrund schmierig belegt. In gleicher Höhe bestehen an der Streckseite des rechten Unterschenkels mehrere ebenfalls scharf umschriebene, geschwürige Veränderungen von kleineren Ausmaßen. Alle Stellen früherer Artefakte sind narbig abgeheilt. Diese Narben zeigen zum Teil eine livide Verfärbung und keloidartige Formen.

Daß es sich auch jetzt wieder um eine Selbstbeschädigung handelte, war mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Es wurden anfänglich Alkoholverbände gemacht; dann erfolgte Behandlung mit Desitinjale unter Steifgazeverbänden, womit am rechten Unterschenkel eine glatte Abheilung eintrat. Auch das Ulcus am linken Unterschenkel verkleinerte sich zusehends. Letzte Maße: 1,0:0,9 cm.

Die Kranke mußte dann wegen dringenden Antritts einer neuen Dienststelle entlassen werden. In ambulanter Weiterbehandlung erfolgte unter Steißgazeverbänden reißlose Abheilung. Wodurch die Artefakte erzeugt wurden, konnte nicht ermittelt werden.

Fall 21.

Walburga B., 30 jährige, ledige Dienstmagd.

Anamnese: Vor drei Jahren sei plötzlich am linken Handgelenk ein etwa fünfmarkstückgroßer, roter Flecken aufgetreten und zugleich hätten sich in der Umgebung kleine Eiterbläschen gebildet. Der Flecken sei nach einigen Tagen größer geworden, habe sich schwärzlich verfärbt und sei aufgebrochen. Ebenso hätten die umliegenden Pusteln sich zu kleinen Geschwüren entwickelt und der Arm sei dabei stark angeschwollen. Die Kranke suchte deshalb einen Arzt auf, der sie mit Salbenverbänden behandelte, bald aber in ein Krankenhaus einwies, da keine Besserung eintreten wollte. Hier sei nach vier Wochen völlige Heilung erfolgt. Einige Wochen nach der Krankenhausentlassung hätten sich jedoch die gleichen Hautveränderungen am rechten Unterschenkel eingestellt. Etwas oberhalb des rechten Fußgelenkes habe sich zunächst ein breiter, roter Streifen circular um den Unterschenkel gebildet; darauf hätten sich dann wieder kleine Eiterbläschen entwickelt und seien ebenfalls „aufgebrochen“. Auch hier habe eine kurze Krankenhausbehandlung völlige Heilung gebracht und sie sei längere Zeit frei von solchen Erscheinungen geblieben. Vor 1½ Jahren sei aber der alte Krankheitsprozeß am rechten Unterschenkel wieder aufgetreten mit Bildung von diesmal etwas größeren Eiterblasen, die sich angeblich blauschwarz verfärbt hätten und unter starker Schwellung und Schmerzhaftigkeit des ganzen Beines „aufgebrochen“ seien. Die Kranke stand wechselnd in ärztlicher Behandlung und war mehrmals auch in einem Krankenhaus untergebracht. Das Leiden sei zwar zeitweise darauf besser gewesen, sei aber nie mehr völlig ausgeheilt. Es habe sich vielmehr langsam über den ganzen Unterschenkel und auch Oberschenkel ausgebreitet, indem immer wieder neue Stellen in der geschilderten Weise aufgetreten und die alten unter Narbenbildung abgeheilt seien.

Seit einem dreiviertel Jahr hat die Kranke wegen ihrer Hauterkrankung um Rente eingegeben. Erst vor kurzem wurde ihr eine solche auch zugesprochen; gleichzeitig mußte sie sich aber auf Veranlassung der Landesversicherungsanstalt in die hiesige Chirurgische Universitätsklinik zur Begutachtung begeben. Von dort wurde uns die Kranke wegen Verdachtes auf arteficielle Hautschädigung überwiesen.

Menarche mit 13 Jahren. Meneses etwas unregelmäßig, von zweitägiger Dauer und ohne Beschwerden.

Allgemeinbefund: Es handelt sich um eine mittelgroße Kranke in gutem Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex herabgesetzt, Cornealreflex fehlt.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Hautbefund: Der rechte Ober- und Unterschenkel sind vornehmlich an der Vorderfläche und den seitlichen Partien in diffuser Ausfaat mit pfennig- bis markstückgroßen Narbenstellen bedeckt, die alle scharf umschrieben sind und vielfach eine bräunliche Pigmentation aufweisen. Teilweise haben diese Stellen auch keloidartigen Charakter, oder sie zeigen leichte Fältelung und Atrophie der Haut. Im unteren Drittel des rechten Unterschenkels und am Fußrücken finden sich diffus verstreut, pfennig- bis markstückgroße, ulcerierte Hautdefekte mit scharf umschriebenen Rändern und entzündlich gerötetem Hof. Sie weisen im Zentrum meist eine starke, schwarz verfärbte Nekrotenbildung auf; zum Teil haben sie auch einen schmierig, eitrig belegten Grund und verbreiten einen ziemlichen Foetor.

Die Hautpartien zwischen diesen einzelnen Ulcerationen sind bräunlich verfärbt.

Über dem linken Handgelenk ist eine narbige Veränderung vorhanden, die von der Streckseite auf die Beugeseite übergreift. Sie ist scharf gegen die normale Umgebung abgegrenzt, zeigt eine bräunliche bis livide Verfärbung, sowie eine glänzende, atrophische, leicht gefältelte Haut.

Diagnose: Bereits nach der durchaus zweifelhaft erscheinenden Vorgeschichte mit dem unerklärlichen Auftreten des Leidens und dessen ständigem Recidivieren, vollends aber nach dem typischen klinischen Bild, den scharf umschriebenen, an leicht zugänglichen Körperstellen gelegenen Veränderungen, unterliegt es keinem Zweifel, daß es sich in vorliegendem Fall um Artefakte handelt.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Es werden Desitin salbenverbände angelegt und durch Steifgaze gesichert. Schon nach den ersten Verbänden ist eine ganz wesentliche Besserung an allen erkrankten Stellen zu verzeichnen und unter weiterer Durchführung dieser Behandlung erfolgt eine glatte und völlige Heilung sämtlicher Erscheinungen. Ein Neuaufreten gleichartiger, oder anderer Hautdefekte konnte nicht beobachtet werden.

Das die Nekroten und Geschwürsbildungen auslösende Mittel war nicht festzustellen, ebenso wenig ein bestimmtes Motiv hierzu, sodaß es dahingestellt bleiben muß, ob das Verlangen nach einer Rente zu dieser Selbstbeschädigung führte, oder ob diese irgendwelchen Vorstellungen hysterischer Art entsprungen ist, was bei der zweifellos stark hysterischen Veranlagung der Kranken als näherliegend erscheinen dürfte. Die Kranke konnte geheilt entlassen werden mit der eindringlichen Ermahnung, ihr törichtes Unterfangen nicht mehr fortzusetzen.



*Fall 21.
Walburga B.*

Bei den bisher beschriebenen Fällen handelt es sich um Hautbeschädigungen, die als Ausdrucksform einer im übrigen mehr oder minder bei den betreffenden Kranken in Erscheinung tretenden Hysterie zu werten sind. Eine Ausnahme davon bildet nur die erste Kranke, bei der die Hauterscheinungen in einer klar zutage tretenden betrügerischen Absicht erzeugt worden waren und daher als Simulation angesprochen werden müssen. Im gleichen Sinne sind auch die im folgenden noch beschriebenen Selbstbeschädigungen von vier männlichen Kranken als Simulation zu deuten, da sie ebenfalls einem offensichtlichen Betrüge dienen sollten.

Fall 22.

Karl Heinz E., 16-jähriger Schüler.

Anamnese: Vor acht Monaten habe der Kranke in der Schule bei chemischen Übungen infolge Unachtsamkeit eines Mitschülers Ätzverletzungen an der rechten Hand erlitten. Der betreffende Mitschüler erhitzte in einem Reagensglas mit konzentrierter Schwefelsäure versetzte Kupferspäne. Dabei sei der Holzhalter, mit dem das Reagensglas über die Flamme gehalten wurde, wahrscheinlich durch Unvorsichtigkeit aufgegangen, das Reagensglas sei herausgesprungen und sein Inhalt sei dem danebenstehenden E. über die rechte Hand gespritzt. An den verletzten Hautpartien wären anfänglich Blasen aufgetreten, die nach kurzer Zeit aufgebrochen seien. Trotz dauernder ärztlicher Behandlung mit verschiedenen Salben hätten die verätzten Stellen nur eine schlechte Heilungsneigung gezeigt. Sie seien ständig stark gerötet geblieben, besäßen in der Mitte einen „eiterigen Kern“ und von Zeit zu Zeit würden sie immer wieder „von innen heraus“ aufbrechen. Seit 14 Tagen sei dies neuerdings in einem besonders starken Grade eingetreten — merkwürdigerweise gerade zu einer Zeit, da in der Schule die schriftlichen Prüfungsarbeiten begonnen haben —. Da jede ärztliche Behandlung bis jetzt versagt hatte, wurde der Junge von seinem Vater zur Klärung dieser sonderbaren Erkrankung in unsere Klinik gebracht.

Allgemeinbefund: Der seinem Alter entsprechend kräftig gebaute Junge zeigt einen guten Ernährungszustand.

Innere Organe sind ohne krankhaften Befund.

Nervensystem: Rachenreflex ist herabgesetzt, Cornealreflex fehlt!

Spezieller Befund: An der rechten Hand, ausschließlich auf deren Streckseite gelegen, finden sich zahlreiche Hautdefekte. Über der Handwurzel, dem Handrücken, der I. und II. Phalanx sämtlicher Finger, sowie

über dem Metacarpale des Daumens sieht man zum größten Teil ganz frische, mit blutig-serösem Sekret bedeckte Exkoriationen, teils aber auch mit bräunlichen Krusten belegte Herde, die bereits einem abheilenden Stadium angehören. Sämtliche Hautdefekte sind scharf umschrieben und haben eine länglich-ovaläre Form von $1\frac{1}{2}$ —2 cm Länge und $\frac{1}{2}$ cm Breite. Auch auf der Streckseite des rechten Unterarmes, im vorderen Drittel, sowie mitten über dem linken Handrücken sind je zwei gleichartige Hautdefekte gelegen. Neben diesen eben beschriebenen Veränderungen kann man weiter feststellen, wie bereits abgeheilte, frisch vernarbte Stellen erneut aufgekratzt sind und leichte Blutungen bezw. feine, frische Blutkrüstchen aufweisen.

Diagnose: Alle diese Hauterscheinungen, die nach ihrer ganzen Anordnung an der rechten Hand ausgesprochene Kratzspuren sämtlicher linken Finger darstellen, müssen daher schon auf den ersten Blick als solche angesprochen werden.

Dem Jungen wird ins Gesicht gesagt, daß er sich diese Verletzungen selbst beigebracht habe, was er freilich hartnäckig leugnete. Zu dem so charakteristischen klinischen Bild kommt noch die aus den Angaben des Vaters zu entnehmende Absicht des Jungen, sich den unangenehmen schriftlichen Prüfungen zu entziehen, da er ja die verbundene rechte Hand nicht zum Schreiben benutzen konnte. Es dürfte wohl kein Zweifel bestehen, daß es sich hier um sichere Artefakte handelt.

Der Vater des Jungen, sowie der behandelnde Arzt werden über die Erkrankung aufgeklärt.

Fall 23.

Jakob Z., 30 jähriger, lediger Landhelfer

Anamnese: Der Kranke erlitt vor acht Jahren durch den Hufschlag eines Pferdes eine Verletzung am linken Knie. Die Wundstelle sei lange Zeit offen geblieben und sei erst nach einer Transplantation von der Haut des Oberschenkels zugeheilt. Z. bezog bis vor 2 Jahren wegen dieses landwirtschaftlichen Unfalles eine Rente. Vor 7 Monaten hatte der Kranke einen weiteren beruflichen Unfall. Er wurde von einer Kuh angeprungen und erhielt hierbei wieder an der alten Verletzungsstelle am linken Knie Abschürfungen, die, wenn auch anfänglich von leichter Natur, ebenfalls erst nach auffallend langer Zeit abheilten. Das linke Knie sei aber ständig stark geschwollen geblieben, weshalb der behandelnde Arzt Umschläge mit eßigsauren Tonerde verordnete. Daraufhin seien an der Haut kleine Eiterbläschen entstanden, die vor ungefähr drei Monaten zu einem erneuten „Aufbrechen“ des Knies geführt hätten. Die bisherige Behandlung mit Salben sei ohne den geringsten Erfolg geblieben, weshalb der Arzt den Kranken unserer Klinik überwies. Z. hat im Anschluß an diesen Unfall neuerdings um Rente nachgesucht!

Allgemeinbefund: Der Kranke ist von asthenischem Habitus und zeigt einen reduzierten Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: Lunge: perkutorisch, auskultatorisch und röntgenologisch o. B.

Herz: absolut und relativ zwei Querfinger nach links verbreitert. Über der Mitralis lang gezogenes, systolisches Geräusch hörbar, (vor drei Jahren habe eine Herzerkrankung mit Fieber bestanden).

Bauchorgane: o. B.

Nervensystem: Rachenreflex und Cornealreflex fehlen.

Im oberen Brustbereich deutlich nachweisbarer idiopathischer Muskelwulst.

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Befund: Das linke Kniegelenk zeigt an seiner Vorderseite, besonders über der Patella eine Rötung der Haut und im ganzen eine geringe Schwellung. An der Innenseite finden sich alte narbige Veränderungen, sowie fünf über bohnergroße, geschwürige Hautdefekte. Diese sind scharf umschrieben und haben ziemlich glatte Ränder. Der Geschwürsgrund ist grau-weißlich, krustig belegt, die Geschwürstiefe beträgt wenige Millimeter. In der Umgebung ist die Haut stärker gerötet und verdickt. Neben diesen frischen Geschwürsstellen sieht man auch bereits in Abheilung begriffene, mehr im oberen Drittel des Unterschenkels gelegene Herde, sowie außerdem zahlreiche, frische Narben, die wohl ebensolchen, schon abgeheilten Hautdefekten entsprechen dürften.

Die Beweglichkeit im linken Kniegelenk ist eingeschränkt und aktive Beugung nicht ganz bis zu einem rechten Winkel möglich.

Maße:

Umfang	oberer Rand der Patella	Mitte der Patella	unterer Rand der Patella
Linkes Kniegelenk	33,5 cm	35,5 cm	33,0 cm
Rechtes Kniegelenk	32,0 cm	33,5 cm	32,0 cm

In der Mitte der linken Oberschenkelflexionsseite ist eine depigmentierte, 4,5 : 3,5 cm große Narbe, als Rest der oben angeführten Plastik, zu sehen. Am rechten Handrücken finden sich mehrere, kleinere Narben, angebliche Verbrennungsfolgen.

Diagnose: Die scharf umschriebenen Hautdefekte am linken Kniegelenk und ihre immerhin ganz unklare Entstehungsursache mußten den Verdacht auf Artefakte erwecken.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Nach Reinigung der Geschwüre unter Moronalkompressen wurde zu Desitinverbänden übergegangen. Hierbei wurde jedoch wiederholt eine wesentliche Verschlechterung sämtlicher Stellen beobachtet, welche starke Rötung und ganz frische Blutungen aufwiesen und dadurch den Verdacht erweckten, daß diese Verschlimmerung durch Irritationen der Haut von seiten des Kranken verursacht würde.

Es wurden deshalb Steifgazeverbände angelegt, unter denen rasch eine auffallende Besserung eintrat. Bei probeweisem Freilassen der Stellen zeigte sich sofort wieder Verschlechterung in angeführter Weise. Unter den Steifgazeverbänden fühlte sich der Kranke sichtlich nicht wohl, da die Heilung gut fortschritt und seine Entlassung bald zu erwarten stand. Sein Bestreben, in irgendeiner Weise krank zu erscheinen, kam dadurch zum Ausdruck, daß er jetzt ständig über Magenbeschwerden klagte, für die sich jedoch absolut kein objektiver Befund erheben ließ.

Unter Steifgaze-Desitinjalbenverbänden wurde eine völlige Abheilung sämtlicher geschwürigen Veränderungen des linken Kniegelenkes erzielt. Das Kniegelenk selbst zeigte keinerlei Schwellungen mehr; auch war die Bewegungsmöglichkeit wieder vollkommen frei. Der Kranke konnte daher geheilt, arbeitsfähig entlassen werden. Die Diagnose „Artefakte“ dürfte nach dem glatten Heilverlauf ex therapia ihre Bestätigung gefunden haben. Z. machte auch ständig den Eindruck eines äußerst arbeitscheuen Menschen, dessen ganzes Streben nur auf Erhalt einer erneuten Unfallrente gerichtet schien.

Fall 24.

Jakob H., 55 jähriger, verheirateter Landwirt.

Anamnese: 1914 hatte sich der Kranke in den ersten Mobilmachungstagen bei einem Militärpferdetransport angeblich infolge Erkältung eine schwere Bronchitis zugezogen, weswegen er in der Folgezeit nur garnisonverwendungsfähig blieb und in einer Truppenküche beschäftigt wurde. Hier sei ihm 1916 heißes Wasser über den rechten Fuß geschüttet worden, was zu einer stärkeren Verbrühung der Haut geführt habe. Es seien an der verbrühten Stelle große Brandblasen entstanden, die vom Arzt eröffnet wurden. Darauf sei zwar eine rasche Heilung eingetreten, die frisch vernarbten Stellen seien jedoch durch den Druck des Stiefels ständig wieder aufgebrochen. Der Arzt soll diese Hautveränderungen damals als nässende Flechte bezeichnet haben. Trotz aller möglichen Behandlung sei das Leiden nie mehr verschwunden; es habe sich wohl unter ärztlicher Behandlung zeitweise gebessert, jedoch habe der Kranke seit 1916 bis jetzt deshalb dauernd den Arzt aufsuchen müssen.

1920 sei bei ihm eine Lungenerkrankung aufgetreten, die er als Kriegsleiden auf die 1914 erworbene Bronchitis zurückführt. Er habe damals Blutspucken müssen und sei längere Zeit in einem Krankenhaus gewesen, wo angeblich ein Tbc. festgestellt wurde. Damals hätten sich an der linken Brustseite eitrige Knötchen gebildet und aus diesen kleine Geschwüre. Auch diese Hauterscheinungen seien, wie die am rechten Fuß, anfänglich unter ärztlicher Behandlung gut abgeheilt, in der folgenden Zeit aber, immer wieder aufgebrochen.

H. bezieht wegen seiner Erkrankung im ganzen 40% Kriegsrente!

Bei diesen Angaben widersprach sich auf wiederholte Fragen der Kranke dauernd. So verneinte er z. B. nach einiger Zeit, 1920 eine

Hämoptoë gehabt zu haben, während er dies anfangs angegeben hatte. Weiter gab er eines Tages an, der „Ausschlag“ an der Brust rühre von einer Verletzung mit einem scharfen Knochen her, die er 1916 in der Truppenküche erlitten habe, während er kurz vorher noch geschildert hatte, wie diese Hautveränderungen 1920 infolge seiner Lungenerkrankung entstanden seien. Als er merkte, daß er durch die wiederholten Fragen sich in Widersprüche verwickelte, verweigerte er weitere Auskünfte mit der Begründung, er könne sich an all diese Dinge nicht mehr so genau erinnern; zu Hause habe er sich aber in einem Büchlein alles aufgeschrieben!

Allgemeinbefund: Der Kranke zeigt einen mittleren Ernährungs- und Kräftezustand.

Innere Organe: Herz: o. B.

Lunge: perkutorisch, auskultatorisch, sowie röntgenologisch war kein krankhafter Befund zu erheben.

Bauchorgane ebenfalls nicht krankhaft verändert.

Nervensystem: Cornealreflex herabgesetzt. Rachenreflex fehlt!

Der Kranke hat das subjektive Gefühl, als ob ihm ein Zwirnknauel im Rachen stecke!

Wa R: — — — M Tr R: — M Kl R: —

Spezieller Befund: Der ganze rechte Fußrücken ist stark gerötet und mit zahlreichen, alten Narben von verschiedener Größe, sowie frischen, geschwürigen Hautdefekten bedeckt. Letztere zeigen eine scharf umschriebene Form und sind pfennig- bis markstückgroß. Nahe dem Interdigitalraum der III. und IV. Zehe, auf der Streckseite des Fußes gelegen, findet sich eine gleiche ulcerierte Stelle. Innen- und Außenseite des Fußes sind im wesentlichen frei von Erscheinungen. Im unteren Drittel des rechten Unterschenkels sieht man zahlreiche, narbig veränderte und bräunlich pigmentierte Hautbezirke, die alle eine scharflinige Begrenzung erkennen lassen; an der Beugeseite ist eine solche Stelle von Handtellergröße und darunter eine etwas kleinere gelegen. Daneben bestehen mehrere, deutliche Kratzeffekte, teils frisch und nässend, teils älterer Natur, mit Krusten belegt.

An der linken Brustseite findet sich eine Hautveränderung, deren obere Begrenzung scharflinig mit dem Schlüsselbein verläuft und die im ganzen eine scharf umschriebene, nahezu quadratische Form aufweist von 8:9 cm Größe. In den Randpartien zeigt diese Stelle eine stärkere Pigmentation, sowie geringe Atrophie der Haut; im Zentrum ist sie stärker gerötet und nässend.

Wenige Zentimeter unterhalb dieser Stelle sind einige pigmentlose, narbige Herde von Pfennigstückgröße zu sehen.

Sobald man bei der Untersuchung die erkrankten Hautstellen berührt, zuckt der Kranke angeblich vor Schmerz zusammen und verzieht das Gesicht, was jedoch bei psychischer Ablenkung unterbleibt.

Auffallend ist auch das direkt demonstrative Gebaren, das der Kranke beim Niesen und Husten an den Tag legt, wobei er sich weit abwendet und theatralisch die Hand vorhält.

Diagnose: Das klinische Bild, sowie die völlig unglaublichen Angaben des Kranken sprechen für Artefakte.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Unter einfachen Desinfizalbenverbänden erfolgte anfänglich gute Abheilung. Nach einiger Zeit aber traten plötzlich neue Kratzeffekte am Fußrücken auf. Deshalb wurden am Fuß Steifgazeverbände, an der Brust feste Heftpflasterverbände angelegt. Aber selbst unter Steifgazeverband konnte eines Tages eine neue Exkoration beobachtet werden, die wenige Zentimeter vom Rand des Verbandes entfernt war und wahrscheinlich mittels irgend eines unter den Verband gehobenen Instrumentes erzeugt worden war. Im übrigen aber konnte ein Neuauftreten von Hautveränderungen nicht mehr festgestellt werden und die Artefakte heilten unter Steifgazeverbänden vollkommen ab. Der Kranke konnte völlig geheilt entlassen werden. Bezeichnend war bei seiner Entlassung die Äußerung, daß der Fuß durch die Reibung im Schuh doch bald wieder aufbrechen werde; er sei noch nie lange zugeblieben. Sicher habe ein „böser Feind“ seine Einweisung in die Klinik veranlaßt!

Schon zwei Monate später kommt H. erneut in unsere Klinik zu stationärer Behandlung. Bereits vier Tage nach der Entlassung aus der Klinik sei der Fuß wieder aufgebrochen. Solange die Geschwüre zugeheilt gewesen wären, habe er am Fuß außerordentlich starke Schmerzen gehabt. Mit dem „Aufbrechen“ hätten diese aber wieder etwas nachgelassen. Auch an der Brust bestünde von Zeit zu Zeit Brennen und Stechen. H. befand sich seither wieder ständig in ärztlicher Behandlung und wurde von seinem Arzt wegen Erfolglosigkeit der Behandlung neuerdings in die Klinik eingewiesen.

Befund: An der Brust sind zur Zeit keine frischen Erscheinungen, auch keine Kratzeffekte zu sehen. Im linken Teil der oben erwähnten ungefähr quadratischen Hautveränderung fällt jetzt ein Narbenkeloid auf, das in einer Ausdehnung von 2—3 cm eine schmale, unregelmäßige, quergestellte Leiste darstellt.

Am rechten Unterschenkel und Fuß bestehen die schon oben angegebenen, alten, teils narbigen Veränderungen. Daneben finden sich wieder frische, kleinere Erosionen über den ganzen Fußrücken verstreut. In der Mitte des Fußrückens, in einem alten Narbengebiet gelegen, ist ein neuer pfennigstückgroßer Hautdefekt festzustellen. Im Gebiet der kleinen Zehe sieht man ebenfalls frische, größere, schmierig belegte Erosionen, sämtlich von umschriebener Form.

Behandlung und Krankheitsverlauf: Die erkrankten Hautstellen werden zunächst mit Byrolinjalbenverbänden behandelt. Bereits am zweiten Tage des Klinikaufenthaltes werden frische Hauterscheinungen im Bereich des

Keloids an der Brust festgestellt: frische Rötung und Kratzeffekte deuten sicher darauf hin, daß der Kranke hier die Haut mechanisch lädiert hat. Um erneuten artefiziellen Einwirkungen vorzubeugen, werden Verbände mit Desitin[albe an der Brust durch festen Mastisolabschluß, am rechten Fuß durch Steifgaze gesichert. Hierunter erfolgte eine glatte Heilung. Im weiteren Verlaufe wurde vom Krankenpfleger einmal beobachtet, wie nach Abnahme des Verbandes der Kranke seinen rechten Fuß durch kräftiges Reiben bearbeitete! Nachdem die Veränderungen an der Brust soweit abgeheilt waren, daß kein Verband mehr nötig war, konnten sofort wieder frische Hautläsionen festgestellt werden. Daneben aggravierte der Kranke in direkt auffallender Weise: so suchte er schon bei der geringsten Berührung der Haut, selbst an abgeheilten Stellen, zusammen und äußerte heftige Schmerzen. Nach einer scharfen Zurechtweisung wegen seines betrügerischen Verhaltens wurden keine neuen Hautirritationen mehr beobachtet und es trat eine rasche Heilung sämtlicher erkrankten Stellen ein.

Obwohl H. erklärte, er könne noch nicht arbeiten, wurde er als geheilt, arbeitsfähig entlassen. Dem behandelnden Arzt, sowie der Kasse wurde über die Art der Erkrankung ein genauer Bericht zugeleitet. Nach den vorliegenden Tatsachen muß H. als ein ganz gewissenloser Simulant angesehen werden, der keinerlei Interesse an einer Heilung hatte, sondern dem es vielmehr darauf ankam, im Besitz einer möglichst hohen Rente zu bleiben.

Fall 25.

Johann D., 48 jähriger, verheirateter Landwirt.

Anamnese: 1914 sei dem Kranken durch einen Schuß der Gewehr[schaft zertrümmert worden, dessen Splitter ihn am linken Zeigefinger so verletzt hätten, daß dieser amputiert werden mußte. Er sei darauf nur noch für den Garnisondienst verwendungsfähig geblieben. Im Anschluß an diese Verwundung hätten sich an der linken Hand und am linken Vorderarm Geschwüre gebildet, die in ganz unerklärbarer Weise bis jetzt jedes Jahr wieder erscheinen und nur schwer abheilen sollen. Auch am linken Unterschenkel hätten schon vor längerer Zeit ebensolche Geschwüre bestanden. Der Kranke steht wegen seines Leidens fast ständig in ärztlicher Behandlung. Trotz Anwendung der verschiedensten Salben trete nie eine völlige Heilung ein, weswegen der Arzt den Kranken zur Klärung dieser merkwürdigen Erscheinungen unserer Poliklinik überwiesen habe.

Für vorliegendes Leiden wurde eine Kriegsdienstbeschädigung mit 50% zuerkannt.

Der Kranke hat seit einem Jahr um eine Zusatzrente nachgesucht, da er eine zahlreiche Familie habe und mit größeren Schulden belastet sei. Die zuständige Behörde will jedoch dem Gesuche nicht nachkommen, in Hinblick auf ein immerhin gutes Einkommen des Antragstellers. Seit einem Jahr hat sich nun die Erkrankung des D. auffallend verschlimmert.

Allgemeinbefund: Es handelt sich um einen kräftig gebauten Mann in gutem Ernährungszustand.

An den inneren Organen ist kein krankhafter Befund zu erheben.

Nervensystem: Rachen- und Cornealreflex fehlen!

Spezieller Befund: An der linken Hand ist der Zeigefinger abgesetzt. Man sieht eine reizlose Narbe über dem Metacarpophalangealgelenk. Die am Handrücken gelegene nächste Umgebung zeigt eine stärkere Rötung, innerhalb der drei grauweißliche Blasen von etwa Pfennigstückgröße gelegen sind. Aus einer derselben entleert sich seröse Flüssigkeit.

An der Beugeseite des linken Vorderarmes, und zwar in seinem unteren Drittel, finden sich drei unregelmäßig begrenzte, aber scharf umschriebene, markstückgroße Hautdefekte, nicht tiefgehend, sondern von mehr oberflächlicher Art. Eine dieser Stellen ist leicht nässend, während die übrigen in Abheilung begriffen sind. Auf der Streckseite des linken Vorderarmes besteht ein gleicher, scharf begrenzter Hautdefekt. Die Umgebung zeigt leicht ekzematöse Veränderung, sowie zahlreiche kleine und größere Narben, alle scharf umschrieben und nach Angabe des Kranken von eben solchen „Geschwüren“ herrührend. Gleiche narbig ausgeheilte Stellen weist der linke Unterschenkel an seiner Streckseite, dicht unterhalb des Kniegelenkes auf.

Diagnose: Der Verdacht auf Artefakte, der aus dem klinischen Bild sich ohne weiteres ergibt, bestärkt sich noch durch die Angaben des Kranken bezüglich des jahrelangen Bestehens seines Leidens, sowie der völligen Unklarheit über dessen Entstehungsursache. Ausschlaggebend für die Diagnose Artefakt ist weiter das gleichfalls aus der Vorgeschichte hervorgehende offensichtliche „Desiderium“ nach Rentenerhöhung. Es muß daher das Leiden als eine artefizielle Hautschädigung auf Grund einer Renten-neurose des Kranken angesprochen werden.

Vielleicht dürfte auch die immerhin auf etwas sonderbare Weise 1914 erworbene Verwundung eine Selbstbeschädigung darstellen, deren linksseitige Lokalisation eben aus dem mit der rechten Hand erfolgten Abzug des Gewehres gut zu verstehen wäre. Jedenfalls muß bei der neurotischen Veranlagung des Kranken daran gedacht werden und so erscheint auch hier ein Selbstverstümmelung zur Erreichung der Kriegsuntauglichkeit als sehr suspekt.

Zusammenfassung.

Unter Artefakten versteht man von den Kranken selbst erzeugte Hautveränderungen, die entweder als ein Symptom hysterischer Reaktion auftreten, oder aber einer betrügerischen Absicht, der Simulation, dienen. Sie werden häufig durch einfache, mechanische Gewalteinwirkung, wie Reiben und Kratzen hervorgerufen, meist aber durch Verwendung chemischer Agentien. Das klinische Bild stellt hauptsächlich Geschwürsbildungen dar, die in ihrer Gestaltung häufig eine gewisse Regelmäßigkeit und scharf umschriebene Form erkennen lassen und an solchen Körperstellen lokalisiert zu sein pflegen, die für die Hände leicht zugänglich sind. Eine Abheilung der krankhaften Veränderungen erfolgt meist prompt unter feststehenden Okklusivverbänden, welche es den betreffenden Personen nicht mehr ermöglichen an die erkrankten Hautstellen heranzukommen und diese erneut zu schädigen.

Die oben beschriebenen 25 Fälle von Selbstbeschädigung betreffen 21 weibliche und 4 männliche Personen. Davon sind 5 Fälle, denen eine bewußte betrügerische Absicht zugrunde lag, zur Gruppe der Simulation zu rechnen: bei 2 Männern, vorgerückten Alters bildete das Bestreben eine Kriegsrente weiterzubeziehen, bzw. eine höhere Rente zu erreichen, das ausschließliche Motiv für die Selbstbeschädigungen; ein weiterer Mann, in verhältnismäßig noch jungen Jahren, wollte sich eine Unfallrente erschleichen. Bei zwei Kranken ganz jugendlichen Alters bestand die Absicht, den unangenehmen schriftlichen Arbeiten und Prüfungen in der Schule aus dem Wege zu gehen: eine zehnjährige Schülerin erzeugte bei sich durch Umschnürung mit einer Hanfschnur ein Ödem des rechten Handrückens und ein 16 jähriger Schüler brachte sich schwerste Kratzeffekte vornehmlich am rechten Handrücken und Vorderarm bei.

Die übrigen 21 Fälle, bei denen es sich durchwegs um jüngere, ledige Frauenspersonen handelt, tragen den

Charakter der hysterischen Selbstbeschädigung. Gering ist hierbei allerdings die Zahl derjenigen Fälle, in denen die Methode zur Erzeugung der Hautveränderungen ausfindig gemacht werden konnte; denn nur bei 6 Kranken, das ist in 28,6% der Fälle, war dies einwandfrei möglich.

Als Ursache der Hautläsionen wurde von zwei Kranken Reiben mit den Fingern und Kratzen mit den Fingernägeln zugestanden. Bei einer Kranken wurde ein Fläschchen mit Essigsäure, bei einer anderen ein Fläschchen mit Kresolseifenlösung gefunden, womit sie sich Verätzungen beigebracht hatten. In zwei weiteren Fällen wurde ebenfalls Säure als Mittel zur Erzeugung der Ulcerationen festgestellt.

Auf noch eine Kranke sei hingewiesen, bei der sich zwar nicht ermitteln ließ, womit sie ihr Geschwür am Bein ursprünglich erzeugt hatte, die aber noch kurz vor ihrer Entlassung aus der Klinik beobachtet wurde, wie sie die erkrankte Hautstelle in ihrer Heilung zu hindern suchte und mit einer Scheuerbürste irritierte.

Von Interesse dürfte die Tatsache sein, daß sich bei fast sämtlichen Kranken, auch bei denen, die der Simulation überführt wurden, hysterische Stigmata, nämlich Fehlen oder starke Herabsetzung von Rachen- und Cornealreflex fanden. Dies zeigt, wie Hysterie und Simulation ineinander übergehen können und wie schwer in solchen Fällen oft eine genaue Trennung wird.

Das Fehlen von Rachenreflex und Cornealreflex hat fast immer bei unseren Kranken wertvolle Schlüsse für die Diagnose einer durch Hysterie bzw. Simulation ausgelösten Selbstbeschädigung zugelassen. Die moderne Psychiatrie allerdings steht hier auf einem anderen Standpunkt. *Ewald* ging auf diese Frage ein und betonte in einem Vortrage über: „Moderne psychiatrische Forschungsart“ (gehalten am 26. Juni 1933 in der physikalisch-medizinischen Sozietät, Erlangen): „daß man die Bedeutung derartiger Reflexanomalien für die Diagnose einer Hysterie früher ganz außerordentlich überschätzt hat, sie spielen heute überhaupt keine Rolle mehr!“

Ganz allgemein kann man hierzu vielleicht sagen, daß, es dem Arzte nicht immer möglich ist, auf feinere Unterscheidungsmethoden, deren sich hier die psychiatrische Fachwissen[s]chaft bedient, einzugehen und daß dann diese Schleimhautanästhesien, wenn sie freilich auch manchmal mit Vorbehalt angesehen werden müssen, oft doch als Kriterium für abnorme psychische Veranlagung wertvoll sind.

Einen eigenartigen Unterschied in der Häufigkeit ihres Vorkommens zeigte die Selbstbeschädigung in den verschiedenen Lebensaltern. Die aus nebenstehender Tabelle ersichtliche Verteilung läßt ein überwiegendes Vorkommen im zweiten Lebensjahrzehnt erkennen, worauf auch *Kraepelin* hingewiesen hat.

Jahre	Zahl der Kranken
10—20	12
21—30	9
31—40	2
41—50	1
51—60	1

Weiterhin ist es interessant die Berufszweige zu betrachten, denen unsere Kranken angehörten:

ledig. Dienstmädchen (Stadt)	8
„ Dienstmägde (Land)	4
„ Stütze	1
„ Arbeiterinnen	2
„ Verkäuferin	1
„ Lehrmädchen	1
„ ohne Beruf	2
„ Schülerin	1
„ Schüler	1
„ Landwirtstochter	1
„ Landhelfer	1
verh. Landwirte	2

Diese Aufstellung deckt sich gleichfalls mit einer oben erwähnten Feststellung *Kraepelins*, der bei seinen an Hysterie leidenden Kranken auch ein starkes Überwiegen des ledigen, weiblichen Dienstpersonals beobachtete.

Bezüglich der Lokalisation der Hauterscheinungen ergab sich eine Verteilung folgender Art:

Obere Extremität	5 Fälle
Untere Extremität	4 „
Obere und untere Extremität	3 „
Rumpf	2 „
Rumpf und obere Extremität	1 „
Rumpf und untere Extremität	2 „
Rumpf, obere und untere Extremität	2 „
Rumpf und Gesicht	1 „
Rumpf, Gesicht und obere Extremität	1 „
Rumpf, Gesicht und Hals	1 „
Hals, Gesicht und obere Extremität	1 „
Hals; obere und untere Extremität	1 „
Gesicht	1 „

Die Artefakte fanden sich sechsmal auf der rechten, zweimal auf der linken Körperseite, siebenzehnmal beiderseitig. Es liegt somit bei unseren Fällen ein bei weitem überwiegendes Betroffensein beider Körperhälften vor. Eine Bevorzugung der linken Seite, wie sie von manchen Autoren erwähnt wird, konnten wir also nicht feststellen; auch wurde eine ausgesprochene Symmetrie der Erscheinungen in keinem unserer Fälle beobachtet. Dagegen fanden sich bei 13 Kranken, das ist in über der Hälfte unserer weiblichen Fälle, Störungen der Menstruation, die sich in Unregelmäßigkeit und Schmerzhaftigkeit äußerten.

Die in unserer Klinik beobachteten 25 Fälle verteilen sich auf zehn Jahre und auf eine Gesamtzahl von rund 28000 ambulant und stationär behandelten Kranken. Bei diesem immerhin sehr geringen Prozentsatz von 0,089% darf man wohl allgemein sagen, daß die Neigung zur Selbstbeschädigung in unserer fränkischen Bevölkerung verhältnismäßig gering ist.

Zum Schlusse meiner Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer und Chef, Herrn Professor Dr. Hauck herzlichst zu danken für die gütige Überlassung des Themas und Übernahme des Referates, sowie für alle gütige Förderung, die er dieser Arbeit zuteil werden ließ. Auch Herrn Professor Dr. Dietel möchte ich an dieser Stelle für die vielen freundlichen Ratschläge meinen verbindlichsten Dank aussprechen.

Schrifttum.

- Babinski*, Die angeblichen trophischen Störungen der Haut bei Hysterie. Münchener Mediz. Wochenschrift 1908, S. 430.
- Baer*, Correspondenzblatt für Schweiz. Ärzte 1905, S. 690.
- Bettmann*, Über arteficielle Hautveränderungen bei Soldaten. Deutsche Mediz. Wochenschrift 1919, Nr. 10 und 11, S. 260 und 294.
- Bolten*, Ein Fall von „hysterischer Gangrän“. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankheiten 1922, Bd. 4, S. 270.
- Brauer*, Absichtlich erzeugte Hauterkrankungen. Arch. f. Derm. u. Syph. 1917. Bd. 124, H. 4, S. 595.
- Bunemann*, Über psychogene Dermatosen. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. und Psychiatr. 1922, Bd. 78, S. 115.
- Buschke*, Hysterische Artefakte (Linkshänderin). Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1930, Bd. 32, S. 544.
- Carpintero*, Übertriebene, vorgetäuschte oder künstlich unterhaltene Dermatosen. Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankheiten 1925, Bd. 16, S. 424.
- Colcott Fox* (siehe *Kreücke*), Über die Selbstbeschädigung der Hysterischen. Münchener Mediz. Wochenschr. 1895, S. 72.
- Crippa*, Dermatologische Kriegserfahrungen. Arch. f. Derm. und Syph. 1916, Bd. 123, S. 284.
- Cubero*, Ulceröse Veränderungen durch eine Hysterische vorgetäuscht. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankheiten 1926, Bd. 20, S. 682.
- Dacco*, Arteficielle Hautkrankheiten bei Soldaten. Dermatol. Wochenschr. 1918, Bd. 66, S. 524.
- Darier-Jadassohn*, Grundriß der Dermatologie 1913, S. 136.
- Eckardt*, Beitrag zur Dermatitis dysmenorrhoeica symmetrica. Inaugural-dissertation aus der Univ. Hautklinik, Erlangen, 1925.
- Fischer*, Hysterische Gangrän. (Artefakte). Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1931, Bd. 36, S. 146.
- Frieboes*, Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten 1928, S. 258.
- Galant*, Reflektorische Blutungen bei Mensch und Tier. Betrag zur vergleichenden Reflexologie. Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1927, Bd. 22, S. 224.

- Ganzoni*, Zur Diagnose und Differentialdiagnose des Artefaktes. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankh. 1933, Bd. 46, S. 327.
- Gaupp*, Über den Begriff Hysterie. Zeitschr. f. d. gef. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 5, 1911.
- Gouin*, Die Simulanten in der Dermatologie. Geschwüre durch Kaliumbichromat und Dermatitisen durch Rinde des „Daphne gnidium“. Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1922, Bd. 4, S. 357.
- Hauck*, Beitrag zur Dermatosis symmetrica dysmenorrhoeica (Maßenauer-Polland). Wiener Mediz. Wochenschr. 1925 Nr. 6 und 8.
- Jankovich*, Interessante Selbstbeschädigungsfälle. Vierteljahrschrift für gerichtl. Mediz. 1917, Bd. 53, H. 2, S. 260.
- Kauffmann*, Handbuch der Unfallmedizin Bd. 1, S. 158 ff. 196 ff., 208 ff.
- Kraepelin*, „Einführung in die Psychiatrische Klinik“ 1921. Bd. I, S. 93 ff., 178.
- Kraepelin-Lange*, Allgemeine und klinische Psychiatrie. 1927.
- Kreibich*, Dermatitis angioneurotica. Arch. für Derm. und Syph. 1918, Bd. 122, S. 257.
- Kretschmer*, „Über Hysterie“. 1927.
- Liniger*, Monatschrift für Unfallheilk. u. Versicherungsmed. 1909, S. 396 ff.
- Mucha*, Nekrosen, Gangrän, Geschwüre. Handbuch der Haut- u. Geschl. Krankh., herausgegeben von Jadassohn, Verlag von Julius Springer, Berlin 1928. Bd. VI, 2. Teil, S. 301.
- Patry*, Revue med. la Suisse romande 1903. V. 23, S. 326.
Revue Suisse des Accidents de travail. — (Schweiz. Zeitschr. für Unfallkunde) 1907 S. 8 ff., S. 5.
- Polland*, „Auffallende Kratzeffekte bei einer Hysterica“. Dermatol. Zeitschrift 1910, Bd. 17, S. 564.
Neue Beiträge zur Klinik der Dermatosis dysmenorrhoeica symmetrica. Arch. f. Derm. u. Syph. 1921, Bd. 131, S. 453.
- Rafsch*, Ein Fall von sogenannter hysterischer Dermatoze. Arch. f. Derm. und Syph. 1916, Bd. 121, H. 1, S. 21.
- Riecke*, Zur Kasuistik der Gangränä cutis. Wiener klin. Wochenschr. 1899. Nr. 14.
Über arteficielle Kutisnekrose. Dermatol. Zeitschrift 1818, Br. 26, S. 36 ff.
Lehrbuch der Haut- und Geschl. Krankheiten 1931, S. 163.
- Sachs*, Selbstbeschädigung der Haut- und Geschlechtsorgane bei Soldaten. Wiener mediz. Wochenschrift 1924, Nr. 31, 33, 35, 36.
- Sack*, Zur Kasuistik und Problematik psychogener Dermatosen. „Der Nervenarzt“ 1929, S. 86.
- Samuel-Freud*, Fall Graham Little. Dermatol. Zeitschrift 1926, Bd. 48, S. 86.
- Schmidt*, Pseudovenerische Geschwüre. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Mediz. 1917, Bd. 54. H. 2, S. 224.
- Schock*, Die künstlich erzeugten Krankheiten und ihre Begutachtung. Ärztl. Sachverständigenzeitung 1920, S. 104.
- Stöfß*, Monatschrift f. Unfallheilk. u. Versicherungsmedizin 1909, S. 313.

Schrifttum.

- Babinski*, Die angeblichen trophischen Störungen der Haut bei Hysterie. Münchener Mediz. Wochenschrift 1908, S. 430.
- Baer*, Correspondenzblatt für Schweiz. Ärzte 1905, S. 690.
- Bettmann*, Über arteficielle Hautveränderungen bei Soldaten. Deutsche Mediz. Wochenschrift 1919, Nr. 10 und 11, S. 260 und 294.
- Bolten*, Ein Fall von „hysterischer Gangrän“. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankheiten 1922, Bd. 4, S. 270.
- Brauer*, Absichtlich erzeugte Hauterkrankungen. Arch. f. Derm. u. Syph. 1917, Bd. 124, H. 4, S. 595.
- Bunemann*, Über psychogene Dermatosen. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. und Psychiatr. 1922, Bd. 78, S. 115.
- Buschke*, Hysterische Artefakte (Linkshänderin). Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1930, Bd. 32, S. 544.
- Carpintero*, Übertriebene, vorgetäuschte oder künstlich unterhaltene Dermatosen. Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankheiten 1925, Bd. 16, S. 424.
- Colcott Fox* (siehe *Krecke*), Über die Selbstbeschädigung der Hysterischen. Münchener Mediz. Wochenschr. 1895, S. 72.
- Crippa*, Dermatologische Kriegserfahrungen. Arch. f. Derm. und Syph. 1916, Bd. 123, S. 284.
- Cubero*, Ulceröse Veränderungen durch eine Hysterische vorgetäuscht. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankheiten 1926, Bd. 20, S. 682.
- Dacco*, Arteficielle Hautkrankheiten bei Soldaten. Dermatol. Wochenschr. 1918, Bd. 66, S. 524.
- Darier-Jadassohn*, Grundriß der Dermatologie 1913, S. 136.
- Eckardt*, Beitrag zur Dermatitis dysmenorrhoeica symmetrica. Inauguraldissertation aus der Univ. Hautklinik, Erlangen, 1925.
- Fischer*, Hysterische Gangrän. (Artefakte). Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1931, Bd. 36, S. 146.
- Frieboes*, Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten 1928, S. 258.
- Galant*, Reflektorische Blutungen bei Mensch und Tier. Betrag zur vergleichenden Reflexologie. Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1927, Bd. 22, S. 224.

- Ganzoni*, Zur Diagnose und Differentialdiagnose des Artefaktes. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankh. 1933, Bd. 46, S. 327.
- Gaupp*, Über den Begriff Hysterie. Zeitschr. f. d. gef. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 5, 1911.
- Gouin*, Die Simulanten in der Dermatologie. Geschwüre durch Kaliumbichromat und Dermatitis durch Rinde des „Daphne gnidium“. Zentralbl. f. Haut- und Geschl. Krankh. 1922, Bd. 4, S. 357.
- Hauck*, Beitrag zur Dermatosis symmetrica dysmenorrhoeica (Maßenauer-Polland). Wiener Mediz. Wochenschr. 1925 Nr. 6 und 8.
- Jankovich*, Interessante Selbstbeschädigungsfälle. Vierteljahrschrift für gerichtl. Mediz. 1917, Bd. 53, H. 2, S. 260.
- Kauffmann*, Handbuch der Unfallmedizin Bd. 1, S. 158 ff. 196 ff.; 208 ff.
- Kraepelin*, „Einführung in die Psychiatrische Klinik“ 1921. Bd. I, S. 93 ff., 178.
- Kraepelin-Lange*, Allgemeine und klinische Psychiatrie. 1927.
- Kreibich*, Dermatitis angioneurotica. Arch. für Derm. und Syph. 1918, Bd. 122, S. 257.
- Kretschmer*, „Über Hysterie“. 1927.
- Liniger*, Monatschrift für Unfallheilk. u. Versicherungsmed. 1909, S. 396 ff.
- Mucha*, Nekrosen, Gangrän, Geschwüre. Handbuch der Haut- u. Geschl. Krankh., herausgegeben von Jadassohn, Verlag von Julius Springer, Berlin 1928. Bd. VI, 2. Teil, S. 301.
- Patry*, Revue med. la Suisse romande 1903. V. 23, S. 326.
Revue Suisse des Accidents de travail. — (Schweiz. Zeitschr. für Unfallkunde) 1907 S. 8 ff., S. 5.
- Polland*, „Auffallende Kratzeffekte bei einer Hysterica“. Dermatol. Zeitschrift 1910, Bd. 17, S. 564.
Neue Beiträge zur Klinik der Dermatosis dysmenorrhoeica symmetrica. Arch. f. Derm. u. Syph. 1921, Bd. 131, S. 453.
- Rajch*, Ein Fall von sogenannter hysterischer Dermatoze. Arch. f. Derm. und Syph. 1916, Bd. 121, H. 1, S. 21.
- Riecke*, Zur Kasuistik der Gangräna cutis. Wiener klin. Wochenschr. 1899. Nr. 14.
Über arteficielle Kutisnekrose. Dermatol. Zeitschrift 1818, Br. 26, S. 36 ff.
Lehrbuch der Haut- und Geschl. Krankheiten 1931, S. 163.
- Sachs*, Selbstbeschädigung der Haut- und Geschlechtsorgane bei Soldaten. Wiener mediz. Wochenschrift 1924, Nr. 31, 33, 35, 36.
- Sack*, Zur Kasuistik und Problematik psychogener Dermatosen. „Der Nervenarzt“ 1929, S. 86.
- Samuel-Freud*, Fall Graham Little. Dermatol. Zeitschrift 1926, Bd. 48, S. 86.
- Schmidt*, Pseudovenerische Geschwüre. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Mediz. 1917, Bd. 54. H. 2, S. 224.
- Schock*, Die künstlich erzeugten Krankheiten und ihre Begutachtung. Ärztl. Sachverständigenzeitung 1920, S. 104.
- Stöfß*, Monatschrift f. Unfallheilk. u. Versicherungsmedizin 1909, S. 313.

- Strümpell*, Über einen Fall von [chwerer Selbstbeschädigung bei einer Hysterischen. Deutsche Zeitschrift f. Nervenheilkunde 1892, Bd. 2, S. 350.
- Török*, Die Lehre von angioneurot. und hämatog. Hautentzündungen. Dermatol. Zeitschr. 1910, Bd. 17, S. 619 und 707.
- Towle*, Aussprache zur Diagnose Fall Rockwood. Zentralbl. für Haut- und Geschl. Krankh. 1931, Bd. 38, S. 626.
- Trombetta*, Ärztl. Sachverständigenzeitung 1907, S. 81.
- Vaifinger*, „Die Philosophie des Als ob“, Felix Meiner, Leipzig 1918.
- Waldstein*, Über künstlich erzeugte Phlegmonen. Ärztl. Sachverständigenzeitung 1920, S. 104—105.
- Wilson, E.* (siehe *Rasch*), Ein Fall von sogenannter hysterischer Dermato- tose. Arch. f. Derm. u. Syph. 1916, Bd. 121, S. 24.
- v. Zumbusch*, Die Geschlechts- und Hautkrankheiten im Weltkrieg. Münchener Mediz. Wochenchr. 1934/II, S. 1210 ff.
-

Lebenslauf.

Am 30. Juli 1907 bin ich, Friedrich Michel, als Sohn des damaligen Kunstgärtnereibesizers Leonhard Michel und seiner Ehefrau Betty, geb. Michel, in Nürnberg geboren. Ich besuchte vier Jahre die dortige Volkssimultanhauptschule und trat darauf in das humanistische Alte Gymnasium zu Nürnberg ein, das ich am 7. April 1927 absolvierte. Sodann wandte ich mich dem Studium der Medizin zu, dem ich zunächst an der Universität Erlangen oblag. Dortselbst bestand ich am 20. November 1929 die ärztliche Vorprüfung. Von den klinischen Halbjahren verbrachte ich eines in Oesterreich, an der Universität Graz, ein weiteres in München, die übrigen wieder in Erlangen, wo ich dann die ärztliche Prüfung ablegte, die ich am 28. Juni 1933 bestanden habe. Nach anschließender, vorschriftsmäßiger Ableistung des praktischen Jahres an der Chirurgischen Universitätsklinik, Erlangen (Prof. Dr. Goetze), der Universitäts-Hautklinik, Erlangen (Prof. Dr. Hauck), sowie am Allgemeinen Städtischen Krankenhaus, Nürnberg: II. Medizinische Klinik (Stadtobermedizinalrat Dr. Scheidemandel) und Patholog. Anatomisches Institut (Prof. Dr. Lauche), erteilte mir das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit Wirkung vom 30. Juni 1934 die ärztliche Approbation. Bis Ende Juli 1934 verblieb ich noch weiterhin im Krankenhaus Nürnberg als Gastarzt am Pathologischen Institut. Seit 1. August 1934 bin ich Volontärarzt an der Universitäts-Hautklinik, Erlangen.
